

تم تحميل هذا الملف من موقع ملفات الكويت التعليمية



[com.kwedufiles.www//:https](https://www.kwedufiles.com)

\*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا

\* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر العلمي اضغط هنا

<https://kwedufiles.com/13>

\* للحصول على جميع أوراق الصف الحادي عشر العلمي في مادة كيمياء وجميع الفصول, اضغط هنا

<https://kwedufiles.com/13chemistry>

\* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر العلمي في مادة كيمياء الخاصة بـ الفصل الأول اضغط هنا

<https://www.kwedufiles.com/13chemistry1>

\* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الحادي عشر العلمي اضغط هنا

<https://www.kwedufiles.com/grade13>

[bot\\_kwlinks/me.t//:https](https://me.t/bot_kwlinks)

للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا

الروابط التالية هي روابط الصف الحادي عشر العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي

مجموعة الفيسبوك

صفحة الفيسبوك

مجموعة التلغرام

بوت التلغرام

قناة التلغرام

رياضيات على التلغرام

أجب عن جميع الأسئلة التالية

أولاً: الأسئلة الموضوعية ( 21 درجة )

**السؤال الأول :**

أ - اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية: (  $6 \times \frac{1}{2} = 3$  )

1- اندماج الأفلاك الذرية المختلفة لنفس الذرة لتكوين أفلاك جديدة تمتاز بخواص وسطية بين

الأفلاك المندمجة .  
( نظرية التهجين )      ص21

2- كتلة المادة التي تذوب في كمية معينة من المذيب عند درجة حرارة معينة لتكوّن

محلولاً مشبعاً .  
( الذوبانية )      ص52

3- ضغط البخار على السائل عند حدوث حالة اتزان بين السائل وبخاره عند درجة

حرارة معينة.  
( الضغط البخاري )      ص71

4- التغير في درجة غليان محلول تركيزه المولالي واحد لمذاب جزيئي وغير متطاير .

( ثابت الغليان المولالي أو الجزيئي  $K_{bp}$  )      ص72

5- جزءاً معيناً من المحيط الفيزيائي الذي هو موضوع الدراسة .  
( النظام )      ص83

6 - كمية الحرارة الممتصة أو المنطلقة خلال تفاعل كيميائي تحت ضغط ثابت. ص85 ( التغير في الانثالبي  $\Delta H$  )



ب - ضع علامة ( ✓ ) في المربع المقابل للإجابة الصحيحة التي تكمل كل من الجمل التالية:

$$(5 \times 1\frac{1}{2} = 7\frac{1}{2})$$

ص 23

نموذج الإجابة

1 - الرابطة التساهمية الثلاثية تتكون من :

- ( ) ثلاث روابط سيجما ( $\sigma$ ) .  
( ) ثلاث روابط باي ( $\pi$ ) .  
( ✓ ) رابطة سيجما ( $\sigma$ ) و رابطتين باي ( $\pi$ ) .  
( ) رابطتين سيجما ( $\sigma$ ) ورابطة باي ( $\pi$ ) .

ص 31

2 - يرجع سبب التوتر السطحي للماء وارتفاع درجة غليانه عن المركبات المشابهة له إلى تكوين الروابط:

- ( ) التساهمية القطبية بين جزيئات الماء  
( ✓ ) الهيدروجينية بين جزيئات الماء  
( ) التساهمية القطبية بين جزيئات الماء  
( ) الهيدروجينية في جزيء الماء

ص 56

3 - عند زيادة ضغط غاز للضعف ، فإن ذوبانية الغاز :

- ( ✓ ) تزداد للضعف  
( ) تظل ثابتة  
( ) تقل للنصف  
( ) تقل للربع

4 - كتلة كربونات الصوديوم ( $\text{Na}_2\text{CO}_3 = 106 \text{ g/mol}$ ) اللازمة للحصول على محلول تركيزه ( $0.5 \text{ M}$ )

ص 62

وحجمه ( $0.25 \text{ L}$ ) تساوي :

- ( )  $0.125 \text{ g}$   
( ✓ )  $13.25 \text{ g}$   
( )  $53 \text{ g}$   
( )  $106 \text{ g}$

ص 86

5 - من المعادلة الكيميائية الحرارية التالية :  $2\text{Fe} (s) + 3/2 \text{O}_2 (g) \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 (s) + 820\text{kJ}$

فإن جميع العبارات التالية صحيحة عدا :

- ( ) حرارة التفاعل تساوي  $-820 \text{ kJ}$   
( ) حرارة الاحتراق القياسية للحديد تساوي  $-410 \text{ KJ/mol}$   
( ✓ ) حرارة التكوين القياسية لأكسيد الحديد III تساوي  $-820 \text{ kJ/mol}$   
( ) المحتوى الحراري للناتج أكبر من المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة



**السؤال الثاني :**

**أ - إملأ الفراغات في الجمل التالية بما يناسبها علمياً :** (  $5 \times 1\frac{1}{2} = 7\frac{1}{2}$  )

15ص

1 - تنتج الرابطة التساهمية .... سيجما  $\sigma$  ... عن تداخل فلكي ذرتين رأساً لرأس.

**نموذج الإجابة**

47ص

2- ملح فلوريد المغنيسيوم  $MgF_2$  .... لاذوب/شحيح الذوبان ..... في الماء .

60ص

3- خفف 50 ml من الأستون النقي بالماء ليعطي محلولاً حجمه 250 ml ، فإن النسبة المئوية للأستون في المحلول هي 20%.....

71ص

4- الضغط البخاري لثنائي ايثيل إيثر ... أقل ... من الضغط البخاري للماء عند نفس درجة الحرارة.

84ص

5- يُصنف التفاعل الكيميائي:  $2C (s) + H_2 (g) + 227kJ \rightarrow C_2H_2 (g)$  من التفاعلات ... الماصة ... للحرارة.

**( ب ) اكتب علامة ( ✓ ) بين القوسين المقابلين للعبارة الصحيحة وعلامة ( × ) بين القوسين**

(  $6 \times \frac{1}{2} = 3$  )

**المقابلين للعبارة غير الصحيحة في كل مما يلي:**

1 - في تهجين الأفلاك  $sp^3$  ، يتم دمج فلك واحد 2s مع فلكين 2p لتكوين ثلاثة أفلاك مهجنة. ص21 ( × )

2 - للماء قدرة على الإذابة بسبب القيمة العالية لثابت العزل الخاصة به. ص32 ( ✓ )


3 - محلول كلوريد الفضة يوصل التيار الكهربائي . ص47 ( × )

4 - عند تحضير محلول مخفف، فإن العدد الكلي لمولات المذاب في المحلول تقل. ص67 ( × )

5 - يتناسب الضغط البخاري للمحلول تناسباً طردياً مع الارتفاع في درجة الغليان. ص71 ( ✓ )

6 - المحتوى الحراري لغاز الأكسجين (  $O_2$  ) يساوي المحتوى الحراري للصوديوم ( Na )

الصلب في الظروف القياسية . ص86 ( ✓ )



ثانياً: الأسئلة المقالية ( 31 درجة )

نموذج الإجابة

السؤال الثالث :

( 2 × 1 = 2 )

( أ ) ما المقصود بكل من :

ص13

1- الفلك الذري ؟

منطقة الفراغ المحيطة بنواة الذرة والتي يتواجد فيها الإلكترون.

ص70

2- الخواص المجمعة للمحاليل؟

تغيير الخواص الفيزيائية عند إضافة مذاب إلى مذيب - أو - التغير في انخفاض الضغط البخاري وارتفاع درجة الغليان وانخفاض درجة التجمد عند إضافة مذاب إلى مذيب.

( 4 × 1/2 = 2 )

ص84

( ب ) قارن بين كل من :

نوع التفاعل	اشارة ΔH	التفاعل الكيميائي
ماص	موجبة	$2C_{(s)} + H_{2(g)} + 227 \text{ KJ} \rightarrow C_2H_{2(g)}$
طارد	سالبة	$CH_{4(g)} + 2O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + 2H_2O_{(l)} + 890 \text{ KJ}$

( 1 × 3 1/2 = 3 1/2 ) ص66

( ج ) حل المسألة التالية :

احسب الكسر المولي لكل من حمض الاستيك (  $C_2H_4O_2 = 60$  ) و الماء (  $H_2O = 18$  ) الذي نتج عن اذابة 66 g من حمض الاستيك في 180 g من الماء .

الحل :

$$n = \frac{m}{Mwt}$$

$$n_{H_2O} = \frac{180}{18} = 10 \text{ mol}$$

$$n_{C_2H_4O_2} = \frac{66}{60} = 1.1 \text{ mol}$$


$$X_A = \frac{n_A}{n_A + n_B} = \frac{10}{10 + 1.1} = 0.9$$

الكسر المولي للماء

$$X_B = \frac{1.1}{10 + 1.1} = 0.0999 = 0.1$$

الكسر المولي لحمض الاستيك

7 1/2



**السؤال الرابع :**

**نموذج الإجابة**

( 2 × 1½ = 3 )

( أ ) علل لما يلي تعليلاً علمياً صحيحاً:

ص24

1 - استقرار الشكل الحلقي السداسي لجزيء البنزين.

التداخل جنباً إلى جنب للأفلاك الذرية  $p_z$  يؤدي إلى عدم تمركز تام في نظام الروابط باي مما يؤدي إلى استقرار الجزيء.


ص32

2- الماء له قدرة عالية على الإذابة.


بسبب القيمة العالية لثابت العزل الخاصة به والتي تجمع جزيئات الماء القطبية التي تفصل الأيونات المختلفة الشحنة للمذاب بعضها عن بعض وتجذبها بعيدة الواحدة عن الأخرى.

( ب ) أكتب المعادلات الأيونية الكاملة والمعادلة الأيونية النهائية مع تحديد الأيونات المتشابهة للتفاعل التالي:


(3 درجات)



1 - المعادلة الأيونية الكاملة:




2 - المعادلة الأيونية النهائية:



3 - الأيونات المتشابهة:  $\text{H}^+$  ,  $\text{NO}_3^-$

( 2 = ½ × 4 ) ص55

( ج ) اجب عن الأسئلة التالية باستخدام الجدول :



المنحنى الموضح: يمثل العلاقة بين ذوبانية كلورات البوتاسيوم ودرجة الحرارة

والمطلوب: أكمل العبارات التالية

- 1 - تقل ذوبانية كلورات البوتاسيوم في الماء ( الساخن / البارد ) ... البارد ..
- 2 - عملية ذوبان كلورات البوتاسيوم ( ماصة / طاردة ) ... ماصة ... للحرارة.
- 3 - المحلول الذي يحتوي على ( 11g / 100 g H<sub>2</sub>O ) من كلورات البوتاسيوم عند 0 °C يعتبر محلول ( مشبع / غير مشبع / فوق مشبع ) ... فوق مشبع ..
- 4 - استنتج العلاقة بين ذوبانية كلوريد البوتاسيوم ودرجه الحرارة .... علاقة طردية ....

8



**نموذج الإجابة**

**السؤال الخامس:**

(درجتان)

ص55

**(أ) ماذا يحدث في الحالة التاليه:**

- عند بذر السحب التي تحتوي على كتل من الهواء فوق المشبع ببحار الماء ببلورات من يوديد الفضة.  
ماذا يحدث؟ تسقط الأمطار الصناعية  
السبب: تنجذب جزيئات الماء الي أنيونات يوديد الفضة مكونه قطرات مائية تعمل كقطرات بدء التبلور  
لجزيئات الماء الأخرى وهكذا تنمو قطرات الماء وتكبر وتسقط على شكل امطار

( 6 × ½ = 3 )

( 15 ص ) ( 17 ص )

**( ب ) أكمل الجدول التالي:**

HC ≡ CH	H <sub>2</sub> C = CH <sub>2</sub>	وجه المقارنة
3	5	مجموع عدد الروابط سيجما σ
2	1	مجموع عدد الروابط باي π
sp	Sp <sup>2</sup>	نوع التهجين في ذرة الكربون

( 1 × 3 = 3 )

ص72

**( ج ) حل المسألة التالية:**

- تنخفض درجة تجمد محلول مائي لمذاب جزيئي غير متطاير عن الماء النقي إلى ( -0.744°C )  
عندما يذاب ( 16.9 g ) في ( 250 g ) من الماء .  
والمطلوب: حساب الكتلة المولية للمذاب علماً بأن ثابت التجمد للماء = 1.86°C/m .


$$\Delta T_{f.p} = 0 - (-0.744) = 0.744 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_{f.p} = m \cdot K_{f.p}$$

$$M_{wt} = K_{f.p} \cdot m_s / \Delta T_{f.p} \cdot K_g = 0.744 / 1.86 = 0.2$$

$$= 1.86 \times 16.9 / 0.744 \times 0.25$$

$$= 169 \text{ g/mol}$$



**نموذج الإجابة**

**السؤال السادس :**

(أ) أكمل الجدول التالي عند مزج ( ارتباط ) الأيونات معاً من خلال المعلومات الموضحة أمامك : ص 47 (  $1\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times 3$  )


$NH_4^+$	$Pb^{2+}$	$Cl^-$	$S^{2-}$	$CO_3^{2-}$	$Na^+$
و	هـ	د	ج	ب	أ



رقم الأيونات الممزوجة	المركب المتكون ( يذوب - شحيح الذوبان )
اتحاد أ مع ج	يذوب
اتحاد ب مع هـ	يذوب
اتحاد د مع هـ	شحيح الذوبان

ص 62 (  $4 \times \frac{1}{2} = 2$  )

(ب) أكمل خريطة المفاهيم التالية :



- (توصل التيار في حاله المحلول والمصهور)
- (توصل التيار في حاله المصهور فقط)
- (كلوريد البوتاسيوم)
- (كبريتات الباريوم)

(  $4 \times 1 = 4$  )

(ج) حل المسألة التالية :

مستعيناً بالمعادلات الحرارية التالية:

- 1-  $C (s) + O_2 (g) \rightarrow CO_2 (g)$  ,  $\Delta H = - 393 \text{ kJ}$
- 2-  $H_2 (g) + \frac{1}{2}O_2 (g) \rightarrow H_2O (l)$  ,  $\Delta H = - 286 \text{ kJ}$
- 3-  $2 C_2H_6 (g) + 7O_2 (g) \rightarrow 4CO_2 (g) + 6H_2O (l)$  ,  $\Delta H = - 3000 \text{ kJ}$

احسب حرارة التكوين القياسية للايثان وفقاً للمعادلة التالية :  $2C (s) + 3H_2 (g) \rightarrow C_2H_6 (g)$  ,  $\Delta H = \dots \text{ kJ}$

