

تم تحميل هذا الملف من موقع ملفات الكويت التعليمية



[com.kwedufiles.www//:https](https://www.kwedufiles.com)

\*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا

\* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر العلمي اضغط هنا

<https://kwedufiles.com/14>

\* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر العلمي في مادة رياضيات وجميع الفصول, اضغط هنا

<https://kwedufiles.com/14math>

\* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر العلمي في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل الأول اضغط هنا

<https://www.kwedufiles.com/14math1>

\* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر العلمي اضغط هنا

<https://www.kwedufiles.com/grade14>

\* لتحميل جميع ملفات المدرس اشرف حافظ محمد اضغط هنا

[bot\\_kwlinks/me.t//:https](https://t.me/bot_kwlinks)

للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا

الروابط التالية هي روابط الصف الثاني عشر العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي

مجموعة الفيسبوك

صفحة الفيسبوك

مجموعة التلغرام


بوت التلغرام

قناة التلغرام

رياضيات على التلغرام



وزارة التربية  
منطقة الجهاد التعليمية  
مدرسة يوسف العذبي الصباح الثانوية . بنين  
قسم الرياضيات



## رياضيات

# الصف الثاني عشر علمي

## الفصل الدراسي الأول

٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م

اعداد / اشرف حافظ محمد

تحت اشراف

مدير المدرسة

د / عبد الرحمن العنزي

الموجة الفني

أ/ محمد بدر حاتم

رئيس القسم

أ/ مرسى احمد

أوجد

(٢٠١٨/٢٠١٩م)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+1)^2 - 9}{x^2 - 2x}$$

أوجد

(٢٠١٧/٢٠١٨م)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos x}$$

:

أوجد

(٢٠١٧/٢٠١٨م)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2x^2 - x}}{x + 1}$$

أوجد :

(٢٠١٦/٢٠١٧م)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x + 3x \cos 4x}{5x}$$

أوجد :

(٢٠١٧/٢٠١٦م)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{3x^2 - 5x + 1}}{3x - 5}$$

أوجد :

(٢٠١٦/٢٠١٥م)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 - 3x}}{x - 3}$$

أوجد :

( ٢٠١٥/٢٠١٦ م )

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{\cos x - 1}$$

لتكن  $f(x) = x^2 - |x + 2|$  :

كتاب الطالب

a اكتب  $f(x)$  دون استخدام رمز القيمة المطلقة.

b أوجد:  $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$  ،  $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$

c هل للدالة  $f$  نهاية عندما  $x \rightarrow -2$  ؟

b  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2+x)^3 - 8}{x}$

c  $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{|x+2| - 7}{x^2 - 25}$

كتاب الطالب

أوجد إن أمكن:

a  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 + 5} - 3}{x^2 - 2x}$

b  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt[3]{x^3 + 1}}{\sqrt[3]{x + 1}}$

c  $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{x - 9}{3 - \sqrt{x}}$

أوجد

(٢٠١٩/٢٠١٨م)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 5}{\sqrt{x^2 - 2x - 3}}$$

---

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 7x + 10} : f \text{ لتكن } (:$$

(٢٠١٩/٢٠١٨م)

أوجد مجال الدالة  $f$  ثم ادرس اتصال الدالة  $f$  على  $[-1, 1]$

$$f(x) = \sqrt{4 - x^2} \quad : f \text{ لتكن}$$

(٢٠١٧/٢٠١٨ م)

ادرس اتصال الدالة  $f$  على  $[-2, 2]$

ادرس اتصال الدالة  $f$  على  $[1, 3]$  حيث :

(٢٠١٦/٢٠١٧ م)

$$f(x) = \begin{cases} -2 & : x = 1 \\ x^2 - 3 & : 1 < x < 3 \\ 5 & : x = 3 \end{cases}$$

التمكن الدالة  $f : f(x) = x^2 - 3x$  ، الدالة  $g : g(x) = \sqrt{x}$

(٢٠١٥/٢٠١٦م)

إبحث إتصال الدالة  $(gof)$  عند  $x = -1$

ابحث إتصال الدالة  $f$  عند  $x = -1$  حيث

$$f(x) = \begin{cases} \frac{|x+1|}{x+1} - 2x & : x \neq -1 \\ 2 & : x = -1 \end{cases}$$

كتاب الطالب

لتكن:  $g(x) = 2x + 3$  ،  $f(x) = \frac{|x|}{x+2}$  . ابحث اتصال الدالة  $f \circ g$  عند  $x = 1$

كتاب الطالب

ادرس اتصال الدالة  $f$  على  $[1, 5]$  حيث:

$$f(x) = \begin{cases} 2 & : x = 1 \\ \frac{x^2 + 1}{x} & : 1 < x < 5 \\ \frac{26}{5} & : x = 5 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 5 & : x = 1 \\ ax + b & : 1 < x < 4 \\ b + 8 & : x = 4 \end{cases} \quad \text{متصلة على } [1, 4]. \text{ أوجد قيم الثابتين } a, b$$

باستخدام التعريف أوجد مشتقة الدالة  $f$  :  $f(x) = 3x^2$  عند  $x = -2$

أوجد مشتقة الدالة  $f$  :  $f(x) = \frac{1}{x}$  عند  $x = b$  ,  $b \neq 0$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & : x < 1 \\ 2\sqrt{x} & : x \geq 1 \end{cases} \quad \text{لتكن الدالة } f \quad (2016/2015 \text{ م})$$

دالة متصلة على مجالها ، أوجد  $f'(x)$  إن أمكن

---

$$f(x) = \begin{cases} x - \frac{4}{x} & : x \geq 2 \\ x^2 - 4 & : x < 2 \end{cases} \quad \text{لتكن الدالة } f \quad (2018/2017 \text{ م})$$

أوجد  $f'(x)$  وعين مجالها

بين أن الدالة  $f : f(x) = x^3 - 3x + 2$  تحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة على الفترة  $[0, 4]$  ثم أوجد قيمة  $c$  التي تنبئ بها النظرية (٢٠١٧/٢٠١٦م)

---

أوجد معادلة المماس لمنحنى الدالة  $f : f(x) = \frac{3x-4}{x+2}$  عند  $x = 0$  (٢٠١٧/٢٠١٦م)

للمنحني الذي معادلته  $2\sqrt{y} + y = x$  أوجد:

(٢٠١٧/٢٠١٨ م)

- (1)  $y'$  ميل المماس لهذا المنحني عند النقطة (1 ، 3)
- (2) ميل المماس لهذا المنحني عند النقطة (1 ، 3)

---

إذا كان  $y = x \sin x$  :  
فأثبت أن  $y'' + y - 2 \cos x = 0$  :

(٢٠١٦/٢٠١٧ م)

( b ) إذا كانت :  $f(x) = 2x + 1$  ,  $g(x) = x^3$

(٢٠١٩/٢٠١٨ م)

(1) أوجد  $(g \circ f)'(x)$

(2) أوجد معادلة المماس للدالة  $(g \circ f)(x)$  عند النقطة  $A(0, 1)$

---

$$y = \frac{\sin x}{\sin x + \cos x}$$

( b ) إذا كانت:

(٢٠١٩/٢٠١٨ م)

$$y' = (y \cdot \csc x)^2$$

أثبت أن

تكن الدالة  $f$  :  
$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x & : x \leq -1 \\ x^2 - x - 2 & : x > -1 \end{cases}$$
  
أوجد إن أمكن  $f'(-1)$ .

كتاب الطالب

أوجد مشتقة  
$$f(x) = \frac{4x^2 + 2x}{2x^3 + 5}$$

كتاب الطالب

1 أوجد المشتقات للدوال التالية:

a  $h(x) = \cos^2 x$

b  $g(x) = \frac{x}{\cos x}$

c  $y = \frac{\sin x}{\sin x + \cos x}$

كتاب الطالب | أوجد معادلة المستقيم العمودي لمنحنى الدالة:  $y = \sec x$  عند النقطة  $F\left(\frac{\pi}{3}, 2\right)$

تكن:  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 + 4}$  ،  $g(x) = \sqrt{x}$  ●  
أوجد باستخدام قاعدة السلسلة (1)  $(f \circ g)'$

كتاب الطالب

---

تكن:  $y = u^2 + 4u - 3$  ،  $u = 2x^3 + x$   
أوجد:  $\frac{dy}{dx}$  باستخدام قاعدة التسلسل.

كتاب الطالب

لتكن:  $y = \sqrt[4]{(2x^4 - 3x^2 + 4)^3}$  ، أوجد:  $y'$

---

لتكن الدالة:  $y = \cos x$  .  
بيّن أن  $y^{(4)} + y'' = 0$  .

أوجد ميل المماس للمنحنى الذي معادلته:  $x^2 - y^2 + yx - 1 = 0$  عند  $(1,1)$

إذا كانت  $y = \sqrt{1 - 2x}$  فأثبت أن:  $yy'' + (y')^2 = 0$

أوجد ميل المماس ( $\frac{dy}{dx}$ ) للمنحنى الذي معادلته :  
 $2y = x^2 - \cos y$  عند النقطة  $A(1, 0)$

( إذا كانت الدالة  $f$  متصلة على  $[1, 4]$  :  $f(x) = x + \frac{4}{x}$   
أوجد القيم القصوى المطلقة للدالة في الفترة  $[1, 4]$

(٢٠١٥/٢٠١٦م)

١ لتكن الدالة  $f$  :  $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & : x < 1 \\ 2\sqrt{x} & : x \geq 1 \end{cases}$  (٢٠١٥/٢٠١٦ م)  
دالة متصلة على مجالها ، أوجد  $f'(x)$  إن أمكن

١ أوجد القيم القصوى المطلقة للدالة  $f : f(x) = x^3 - 3x + 1$  في الفترة  $[-2, 1]$ . كتاب الطالب

بين أن الدالة  $f(x) = x^2 + 2x$  تحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة على الفترة  $[-3, 1]$ ،  
ثم أوجد قيمة  $c$  الذي تنبئ به النظرية وفسر إجابتك.

لتكن الدالة  $f : f(x) = -x^3 + 3x^2 - 4$  . أوجد كلاً مما يلي:

- a النقاط الحرجة للدالة.
- b الفترات التي تكون الدالة  $f$  متزايدة أو متناقصة عليها.
- c القيم القصوى المحلية.

درس تغير الدالة  $f$  :  $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 1$   
ثم ارسم بيئاتها

ثانوية يوسف العذبي الصباح

إدرس تغير الدالة  $f$  :  $f(x) = 2x^2 - x^4 + 5$  ثم ارسم بيانها (٢٠١٦/٢٠١٧ م)

ثانوية يوسف العذبي الصباح

ادرس تغير الدالة  $f$  :  $f(x) = x - 2x^3$  وارسم بيانها.

ثانوية يوسف العذبي الصباح

كتاب الطالب | ادرس تغير الدالة:  $f(x) = x^4 - 8x^2 + 7$  وارسم بيانها.

ثانوية يوسف العذبي الصباح

أوجد عددين موجبين مجموعهما 20 وناتج ضربهما أكبر ما يمكن ٢٠١٨/٢٠١٧

أثبت أن من بين المستطيلات التي محيطها  $8\text{ cm}$  واحداً منها يعطي أكبر مساحة ويكون مربعاً ؟

٢٠١٩/٢٠١٨

تعطي الدالة  $V(h) = 2\pi(-h^3 + 36h)$  حجم أسطوانة بدلالة ارتفاعها  $h$ .

كتاب الطالب

a أوجد الارتفاع  $h$  (cm) للحصول على أكبر حجم للأسطوانة.

b ما قيمة هذا الحجم؟

أوجد أقصر مسافة بين النقطة  $A(x, y)$  على المنحنى الذي معادلته  $y = \sqrt{x}$  والنقطة  $B(3, 0)$

كتاب الطالب

يراد صنع صندوق بدون غطاء بقصّ مربّعات متطابقة طول ضلع كلّ منها  $x$  من أركان طبقة صفيح أبعادها  $16\text{ cm}$  ,  $6\text{ cm}$  وثني جوانبها إلى أعلى (انظر الشكل المقابل).  
أوجد قيمة  $x$  بحيث يكون حجم الصندوق أكبر ما يمكن. وما هو حجم أكبر صندوق يمكن صنعه بهذه الطريقة؟

- (  $b$  ) أخذت عينه عشوائية من مجتمع طبيعي حجمها  $n=81$  ومتوسطها الحسابي هو  $\bar{x} = 50$  وانحرافها المعياري  $S=9$  باستخدام مستوى ثقة  $95\%$
- (1) أوجد هامش الخطأ
  - (2) أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي  $\mu$
  - (3) فسر فترة الثقة
- ( 4 درجات )

( b ) يعتقد مدير شركة أن متوسط رواتب المستخدمين لديه 290 دينار ، فإذا أخذت عينة عشوائية من 10 مستخدمين و تبين أن متوسطها الحسابي  $\bar{x} = 283$  دينار وانحرافها المعياري  $S = 32$  دينار . فهل يمكن الإعتماد على هذه العينة لتأكيد ما إفترضه باستخدام مستوى ثقة 95 % ( علما بأن المجتمع يتبع التوزيع الطبيعي ) ( 6 درجات )

---

( b ) أخذت عينة عشوائية من مجتمع طبيعي حجمها  $n = 25$  ، فإذا كان الانحراف المعياري للعينة (s) يساوي 10 ، ومتوسطها الحسابي ( $\bar{x}$ ) يساوي 15 ، استخدم مستوى ثقة 95% لإيجاد:

- 1) هامش الخطأ
- 2) فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي  $\mu$

( b ) أجريت دراسة لعينة من الإناث حول معدل النبض لديهن فإذا كان حجم عينة الإناث  $n = 40$  والانحراف المعياري لمجتمع الإناث  $\sigma = 12.5$  ، والمتوسط الحسابي للعينة  $\bar{x} = 76.3$  . استخدم مستوى ثقة 95% لإيجاد:

- (1) هامش الخطأ
- (2) فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي  $\mu$

متوسط العمر بالساعات لعينة من 100 مصباح كهربائي مصنعة في أحد المصانع  $\bar{x} = 1570$  بانحراف معياري  $S = 120$  . يقول صاحب المصنع إن متوسط العمر بالساعات  $\mu = 1600$  للمصابيح المصنعة في المصنع. اختبر صحة الفرض  $\mu = 1600$  مقابل الفرض  $\mu \neq 1600$  وباختيار مستوى معنوية  $\alpha = 0.05$

كتاب الطالب

احسب مُعامل الارتباط الخطي للمتغيرين التاليين وبيّن نوعه وقوته.

$x$	1	2	3	4	5	6
$y$	4	7	8	3	5	5

$x$	1	3	5	7	9
$y$	2	5	9	10	14

باستخدام البيانات التالية لقيم  $x$  ,  $y$  :

أوجد:

- a معادلة خط الانحدار.
- b قيمة  $y$  عندما  $x = 10$
- c مقدار الخطأ عندما  $x = 5$

امتحان نهاية الفترة الدراسية الأولى للصف الثاني عشر علمي - الرياضيات. 2018 / 2019 م

القسم الثاني ( البنود الموضوعية ) :  
أولاً : في البنود (1-4) ظلل في ورقة الإجابة: (a) إذا كانت العبارة صحيحة  
(b) إذا كانت العبارة خاطئة

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^2 + 5\sin^2 x}{3x^2} = 3 \quad (1)$$

$$(2) \text{ إذا كانت } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{ax^3 + bx^2 + 4}{3x^2 - 2x + 1} = -1 \text{ فإن } a = -3, b = -2$$

$$(3) \text{ الدالة } f : f(x) = x|x| \text{ قابلة للإشتقاق } \forall x \in \mathbb{R}$$

$$(4) \text{ الدالة } f : f(x) = \sqrt[3]{x-1} \text{ تحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة في الفترة } [-1, 2]$$

ثانياً : في البنود (5-14) لكل بند أربع اختيارات واحد فقط منها صحيح ظلل في ورقة الإجابة الرمز الدال على الاختيار الصحيح

$$(5) \text{ إذا كانت الدالة } f : f(x) = \frac{3}{\sqrt{2x-1}} \text{ فإن } f'(1) \text{ تساوي}$$

- (a)  $-\frac{3}{2}$       (b)  $\frac{3}{2}$       (c)  $-3$       (d)  $3$

$$(6) \text{ ميل الناظم لمنحنى الدالة } f : f(x) = \frac{2}{x} \text{ عند } x = -2 \text{ هي :}$$

- (a)  $-2$       (b)  $-\frac{1}{2}$       (c)  $\frac{1}{2}$       (d)  $2$

(10)

امتحان نهاية الفترة الدراسية الأولى للصف الثاني عشر علمي - الرياضيات - 2018 / 2019 م

(7) للدالة  $f : f(x) = -3x + 1$  قيمة عظمى مطلقة في  $[0, 3]$  عند

- (a)  $x = 3$       (b)  $x = 1$       (c)  $x = 0$       (d)  $x = -8$

(8) الدالة  $f : f(x) = \frac{x+1}{25-x^2}$  متصلة على :

- (a)  $\mathbb{R}$       (b)  $[-5, 5]$   
(c)  $\mathbb{R} \setminus \{-5, 5\}$       (d)  $(-\infty, 25)$

(9) إذا كانت الدالة  $f$  متصلة عند  $x = -2$  وكانت  $\lim_{x \rightarrow -2} (x^2 + f(x)) = 7$

فإن  $f(-2)$  تساوي :

- (a) 3      (b) 5      (c) 9      (d) 11

(10) إذا كان  $x^2 + y^2 = 25$  ، فإن  $\frac{dy}{dx}$  تساوي

- (a)  $\frac{x}{y}$       (b)  $\frac{-x}{y}$       (c)  $2x + 2y$       (d)  $-x$

(11) عدد النقاط الحرجة للدالة  $y = 3x^2 - 9x - 4$  على الفترة  $(-2, 0)$  هو :

- (a) 3      (b) 2      (c) 1      (d) 0

(11)

امتحان نهاية الفترة الدراسية الأولى للصف الثاني عشر علمي 2017 / 2018 م  
المجال الدراسي / الرياضيات


(6) إذا كانت الدالة  $f$  : فإن  $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & : x \geq 2 \\ \frac{x^2 - 4}{x - 2} & : x < 2 \end{cases}$

- (a)  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 4$  (b)  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 4$  (c)  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  موجودة (d)  $f$  متصلة عند  $x = 2$

(7) إذا كانت  $g$  دالة متصلة عند  $x = 1$  فإن الدالة المتصلة عند  $x = 1$  فيما يلي هي  $f(x)$  تساوي

- (a)  $\sqrt{g(x)}$  (b)  $\frac{1}{g(x)}$  (c)  $\frac{g(x)}{x - 1}$  (d)  $|g(x)|$

(8) إذا كانت  $f$  دالة كثيرة حدود من الدرجة الثالثة والشكل المقابل  $y = f''(x)$  يوضح بيان  $f''$  فإن منحنى  $f$  مقعراً لأسفل في الفترة



- (a)  $(-\infty, 2)$  (b)  $(0, \infty)$  (c)  $(0, 2)$  (d)  $(2, \infty)$

(9) للدالة  $f : f(x) = \sqrt[3]{x - 1}$  مماس رأسي معادلته

- (a)  $x = 0$  (b)  $y = 0$  (c)  $x = 1$  (d)  $y = 1$

(10) إذا كانت  $y = \sin^{-5}x - \cos^3x$  فإن  $\frac{dy}{dx}$  تساوي

- (a)  $5\sin^{-6}x \cos x - 3\cos^2x \sin x$  (b)  $5\sin^{-6}x \cos x + 3\cos^2x \sin x$   
(c)  $-5\sin^{-6}x \cos x + 3\cos^2x \sin x$  (d)  $-5\sin^{-6}x \cos x - 3\cos^2x \sin x$

انتهت الأسئلة

(11)

دولة الكويت  
وزارة التربية  
إجابة امتحان نهاية الفترة الدراسية الأولى للصف الثاني عشر علمي 2017 / 2018 م  
المجال الدراسي : الرياضيات الزمن : ساعتان و 45 دقيقة الأسئلة في 12 صفحة

القسم الأول : أسئلة المقال  
أجب عن الأسئلة التالية موضحاً خطوات الحل في كل منها:

14

(7 درجات)

السؤال الأول :

(a) أوجد

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos x}$$

الحل :

$$\begin{aligned}
 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{x^2}{1 - \cos x} \cdot \frac{1 + \cos x}{1 + \cos x} \right) \\
 \frac{1}{2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(1 + \cos x)}{1 - \cos^2 x} \\
 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sin^2 x} \cdot (1 + \cos x) \\
 \frac{1}{2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \left( \frac{x}{\sin x} \right)^2 \cdot (1 + \cos x) \right) \\
 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{x}{\sin x} \right)^2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \cos x) \\
 \frac{1}{2} &= \left( \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \right)^2 \cdot \left( \lim_{x \rightarrow 0} 1 + \lim_{x \rightarrow 0} \cos x \right) \\
 \frac{1}{2} + \frac{1}{2} &= (1)^2 \cdot (1 + 1) \\
 \frac{1}{2} &= 2
 \end{aligned}$$

(1)