



وزارة التربية
مكتب الوكيل المساعد للتعليم العام

تمهيد وفتح الاحياء



الفترة الدراسية الثانية

العام الدراسي : 2017 / 2018 م

(عدد الصفحات : 11)

دولة الكويت

نموذج الإجابة

وزارة التربية

التوجيه الفني العام للعلوم

امتحان نهاية الفترة الدراسية الثانية- العام الدراسي 2017-2018 م

المجال الدراسي : الكيمياء للصف الثاني عشر العلمي - الزمن : ساعتان

أولاً : الأسئلة الموضوعية (اجبارية)

السؤال الأول :

(أ) اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات

($6 \times \frac{3}{4} - 4 \frac{1}{2}$)

التالية :

1- مركبات أيونية تتكون من تفاعل الحمض مع القاعدة ينتج عن اتحاد كاتيون القاعدة و أنيون

(الأملح)

الحمض ص. 15

2- كمية المذاب اللازمة لإنتاج محلول مشبع من مادة من المذيب وعند درجة حرارة معينة ص. 24

(الذوبانية)

3- ذرة أو مجموعة ذرية تمثل الجزء النشط الذي تتركز إليه التفاعلات الكيميائية للمركب الذي يحتويها

وتحدّد الصيغة البنائية والخواص الكيميائية لعائلة من المركبات العضوية. (المجموعة الوظيفية) ص. 61

4- مركبات عضوية تحتوي على مجموعة هيدروكسيل (-OH) واحدة أو أكثر مرتبطة بذرة كربون مشبعة.

(الكحولات) ص. 71

5- مركبات عضوية تحتوي على مجموعة كربونيل متصلة بشقي ألكيل ص. 95 (كيتونات أليفاتية)

6- مركبات عضوية تحتوي على مجموعة الكربوكسيل -COOH متصلة بذرة هيدروجين أو بسلسلة

كربونية . ص. 105 (أحماض كربوكسيلية أليفاتية)

نموذج الإجابة

تابع / السؤال الأول :

(7×1=7)

(ب) املأ الفراغات في الجمل والمعادلات التالية بما يناسبها :

- 1- يسمى الشق الحمضي الذي له الصيغة الكيميائية (SO_3^{2-}) كبريتيت . ص 17
- 2- عندما يكون معدل نوبان المذاب مساويا تماما لمعدل ترسيبه يصبح المحلول مشبعاً . ص 24
- 3- إذا تعادلت كمية من حمض أحادي البروتون مع (500 ml) من محلول قاعدي تركيزه (0.1 M)



فإن عدد مولات الحمض تساوي 0.05 mol ص 43


- 4- المجموعة الوظيفية في المركب  -COOH ص 61

- 5- $CH_2=CH_2 + H_2O \xrightarrow{H_2SO_4} \dots CH_3-CH_2-OH \dots$ ص 77

أو $CH_3-CHOH-CH_3$ أو C_3H_7-OH

- 6- عند استخدام محلول تولن فإن الألكهيد يتأكسد إلى الحمض الكريوكسيل المقابل . ص 100

- 7- $CH_3COOH + CH_3CH_2OH \rightleftharpoons \dots CH_3COOCH_2CH_3 \dots + H_2O$ ص 108



درجة السؤال الأول

نموذج الإجابة

السؤال الثاني :

(أ) اكتب كلمة (صحيحة) بين القوسين المقابلين للعبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) بين القوسين

$$(6 \times \frac{3}{4} = 4\frac{1}{2})$$

المقابلين للعبارة الخطأ في كل مما يلي :

1- المحلول المشبع لكوريد الرصاص $PbCl_2$ II يكون فيه تركيز أنيون الكلوريد يساوي تركيز كاتيون الرصاص الثاني. ص 26 (خطأ)

2- تزداد قيمة ثابت حاصل الإذابة K_{sp} للمركب الأيوني شحيح النويان في الماء عند إضافة محلول آخر يحتوي على أيون مشترك للمحلول المشبع. ص 30 (خطأ)

3- تتميز التفاعلات بين الأحماض والقواعد بأنها طاردة للحرارة . ص 42 (صحيحة)

4- يعتبر المركب (2- كلورو - 2- ميثيل بروبان) هاليد ألكيل ثالثي . ص 67 (صحيحة)

5- الفينولات عائلة من المركبات العضوية لا ترتبط فيها مجموعة الهيدروكسيل مباشرة بحلقة البنزين. ص 72 (خطأ)

6- يمكن الحصول على البيوتانون من خلال امرار بخار بيوتانول على نحاس مسخن لدرجة $300^{\circ}C$. ص 97 (صحيحة)



www.kwschfiles.com

(ب) ضع علامة (✓) بين القوسين أمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من العبارات التالية :

$$(6 \times 1 = 6)$$

1- أحد محاليل الأملاح التالية يعتبر من الأملاح متعادلة التأثير و هو : ص 15

() أسيتات الصوديوم () كلوريد الأمونيوم

(✓) فورمات البوتاسيوم (✓) كلوريد الصوديوم

2- يمكن الحصول على محلول منظم عند خلط حجمين متساويين من : ص 35

() محلول تركيزه 0.3 M من NaOH مع محلول تركيزه 0.2 M من CH_3COOH .

(✓) محلول تركيزه 0.1 M من NaOH مع محلول تركيزه 0.2 M من CH_3COOH .


() محلول تركيزه 0.1 M من NaOH مع محلول تركيزه 0.2 M من HCl .

() محلول تركيزه 0.1 M من NH_3 مع محلول تركيزه 0.2 M من HCl .

نموذج الإجابة

تابع / السؤال الثاني (ب) :

3- عند استخدام محاليل متساوية التراكيز، فإن منحنى المعايرة في الشكل المقابل يمثل معايرة : ص 49







() حمض قوي مع قاعدة قوية

(✓) حمض ضعيف مع قاعدة قوية



() حمض ضعيف مع قاعدة ضعيفة (حيث $K_a = K_b$)

() حمض قوي مع قاعدة ضعيفة



4- أحد التفاعلات التالية تعبر عن هلجنة البنزين وهي : ص 68



5- الكحول الثالثي فيما يلي هو : ص 75



6- إحدى الصيغ التالية تمثل كيتون أروماتي وهي : ص 95



درجة السؤال الثاني

ثانياً : الأسئلة المقالية (اجبارية) نموذج الإجابة

السؤال الثالث :

(أ) ما المقصود بكل من :

(3x1=3)

1- تفاعل التعادل ؟

ص 42

تفاعل كاتيون الهيدرونيوم (أو كاتيون الهيدروجين) من الحمض مع أنيون الهيدروكسيد من القاعدة لتكوين الماء.

ص 75

2- كحولات أولية ؟

كحولات ترتبط فيها مجموعة الهيدروكسيل بذرة كربون أولية متصلة بذرتي هيدروجين ومجموعة الكيل أو بذرات هيدروجين.

ص 109

3 - الأمينات ؟

مركبات عضوية مشتقة من الأمونيا (NH₃) مثل طرطرون، البنتاميد، بذرة هيدروجين أو أكثر بما يقابلها من الشقوق العضوية .



(1x3=3)

(ب) أجب عما يلي :

احسب تركيز أيون الكرومات CrO₄²⁻ في محلول مشبع من كرومات الفضة (Ag₂CrO₄)

عند درجة حرارة 25 ° C ، علما بأن K_{sp} (Ag₂CrO₄) = 1.2 × 10⁻¹² . ص 27

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} & \quad [Ag^+] = 2 \times (x) = 2x \text{ mol/L} \\ \frac{1}{2} & \quad [CrO_4^{2-}] = 1 \times (x) = x \text{ mol/L} \\ 1 & \quad K_{sp} = [Ag^+]^2 \times [CrO_4^{2-}] \\ & \quad 1.2 \times 10^{-12} = (2x)^2 \cdot (x) \\ & \quad 4x^3 = 1.2 \times 10^{-12} \\ & \quad x^3 = \frac{1.2 \times 10^{-12}}{4} = 3 \times 10^{-13} \\ & \quad x = \sqrt[3]{3 \times 10^{-13}} = 6.69 \times 10^{-5} \text{ mol/L} \quad \text{أو} \quad (x = 6.7 \times 10^{-5} \text{ mol/L}) \\ & \quad [CrO_4^{2-}] = 6.7 \times 10^{-5} \text{ mol/L} \end{aligned}$$

أو أي حل آخر صحيح

نموذج الإجابة


تابع / السؤال الثالث :

(ج) اختر من القائمة (أ) ما يناسبه من القائمة (ب) في الجدول التالي: ($5 \times \frac{1}{2} = 2\frac{1}{2}$)

م	(أ)		(ب)
1	ناتج أكسدة (2- بروبانول)	5	إيثر ص 86
2	أمين أولي	4	كحول ص 77
3	استر	1	كيتون ص 96
4	ناتج تميؤ هاليد الالكيل في وسط قلوي مع التسخين	3	$\text{CH}_3\text{-CO-OCH}_3$ ص 108
5	استبدال أنيون الهاليد بأنيون الكوكسيد	2	$\text{CH}_3\text{-NH}_2$ ص 110
			الدهيد



www.kwefiles.com



درجة السؤال الثالث

نموذج الإجابة

السؤال الرابع :

(3X1=3)



(أ) علل لما يلي تعليلا علميا صحيحا :

1- يعتبر المحلول المائي لملاح كلوريد الصوديوم متعادلا التأثير . ص 20

لأنه لا تتفاعل أيونات Na^+ و Cl^- مع الماء لأنها مشتقة من قاعدة قوية وحمض قوي

لذلك يكون تركيز كاتيون الهيدرونيوم مساويا لتركيز أنيون الهيدروكسيد.

يمكن الإجابة بالمعادلات على النحو التالي :



(ملاحظة : يتم كتابة المعادلات صحيحة وليس بالضرورة موزونة أو الحالات الفيزيائية)


ص 80

2- لا تتأكسد الكحولات الثالثية بالعوامل المؤكسدة بسبب عدم ارتباط ذرة الكربون المتصلة بمجموعة الهيدروكسيل بذرة هيدروجين .

3- درجات غليان الأمينات الأولية أعلى من درجات غليان الألكانات أو المركبات غير القطبية المقاربة لها في الكتل المولية . ص 111

بسبب وجود مجموعة الأمينو القطبية التي تؤدي إلى ارتباط جزيئات الأمين مع بعضها البعض بروابط هيدروجينية .

(ب) أكمل الجدول التالي بكتابة الاسم العلمي أو الصيغة الكيميائية لكل من : ($5 \times \frac{1}{2} = 2\frac{1}{2}$)

الصيغة الكيميائية	الاسم الكيميائي
$CH_3CH_2CH_2I$	1- يودو بروبان ص 66
$CH_3CH(OH)CH_2CH_3$	2- بيوتانول ص 73
$C_6H_5-O-C_6H_5$ أو 	ثنائي فينيل إيثر ص 84
CH_3-CH_2-COOH	حمض بروبانويك ص 104
$C_2H_5-NH_2$ أو $CH_3CH_2-NH_2$	إيثيل أمين ص 109


نموذج الإجابة

(1×3=3)

تابع / السؤال الرابع :

(ج) أجب عما يلي :

في التفاعل التالي :



إذا تعادل (15 ml) من محلول حمض الكبريتيك تماما مع (10 ml) من هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 0.3 mol. L^{-1} . أحسب تركيز حمض الكبريتيك . ص 44

القانون : عدد مولات OH^- (من القاعدة) = عدد مولات H_3O^+ (من الحمض)

1

$$\frac{n_a}{a} = \frac{n_b}{b}$$

أو

أو

$$\frac{C_a \times V_a}{a} = \frac{C_b \times V_b}{b}$$

التعويض :

1

$$\frac{C_a \times 0.015}{1} = \frac{0.3 \times 0.01}{2}$$

$$C_a = \frac{0.3 \times 0.01}{0.015 \times 2}$$

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$



أو أي حل آخر صحيح

$8\frac{1}{2}$

درجة السؤال الرابع

نموذج الإجابة

السؤال الخامس :

(4x½=2)

ص 21

(أ) أكمل الجدول التالي :

محلول أسيتات الصوديوم CH ₃ COONa	محلول كلوريد الأمونيوم NH ₄ Cl	
الأسيتات CH ₃ COO ⁻ أو	الأمونيوم NH ₄ ⁺ أو	اسم أو صيغة الشق الذي يتما
قاعدي	حمضي	نوع المحلول الناتج (حمضي / قاعدي)

(8 X ½ = 4)

(ب) قارن بين كل من :


CH ₃ CH ₂ CH ₂ Cl	CH ₃ CHClCH ₃	وجه المقارنة
أولي	ثانوي	نوع هاليد الألكيل (أولي - ثانوي - ثالثي) ص 67
1-بروبانول أو بروبانول أو كحول البروبيل CH ₃ CH ₂ CH ₂ OH أو	2-بروبانول أو كحول الأيزو بروبيل أو CH ₃ CHOHCH ₃	الاسم أو الصيغة للناتج الرئيسي من التفاعل مع NaOH ص 69
CH ₃ COCH ₃ أسيتون	CH ₃ CHO أسيتالدهيد	وجه المقارنة
2-بروبانول أو كحول الأيزو بروبيل CH ₃ CHOHCH ₃ أو	الإيثانول أو CH ₃ CH ₂ OH أو	الاسم أو الصيغة لناتج الاختزال بالإضافة مع H ₂ ص 99
أقل		النشاط الكيميائي (أقل - أكثر) ص 91

(5x½=2½)

ص 28

(ج) استخدم المفاهيم التالية لإكمال خريطة مفاهيم

K_{sp} > Q - إضافة أيون مشترك - تكوين أيون مترابك - راسب - يذوب



تابع / امتحان نهاية الفترة الدراسية الثانية في الكيمياء - الصف الثاني عشر العلمي - العام الدراسي 2017/2018م

نموذج الإجابة

(1x2½=2½)

السؤال السادس:

(أ) لديك ثلاثة محاليل من هاليدات الفضة A و B و C ، وهي بتركيز وحجوم متساوية عند درجة 25°C ، أضيف إلى كل منها تدريجياً كميات من محلول نترات الفضة ، فوجد أن الذي يحتاج إلى أكبر كمية لتكوّن راسب هو المحلول C ثم B ثم A الذي يحتاج إلى أقل كمية .

ضع كل من الرموز الافتراضية للمركبات السابقة بما يتناسب مع ثابت حاصل الاذابة له في الجدول التالي :

7.7×10^{-13}	1.8×10^{-10}	1.4×10^{-5}	K_{sp}
A	B	C	الرمز الافتراضي

3x½

- 1
- فسر تكوّن الراسب في محلول هاليد الفضة عند إضافة محلول نترات الفضة له . بسبب وجود أيون مشابه لأحد أيونات النظام (أو بسبب تأثير الأيون المشترك) مما يؤدي إلى زيادة تركيز كاتيون الفضة ، و بالتالي تصبح قيمة الحاصل الأيوني (أو Q) لكبريتات الفضة أكبر من قيمة K_{sp} .


(ب) وضع بكتابة المعادلات الكيميائية ماذا يحدث في الحالات التالية : (4 X 1 = 4)

1- تفاعل كلوريد الإيثيل مع ميثوكسيد الصوديوم .




ص 79

2- تفاعل الميثانول مع فلز البوتاسيوم .




ص 96

3- تمرير بخار الإيثانول على نحاس مسخن درجة حرارته (300°C) .



1- تفاعل نزع جزئ الماء من جزئين من حمض الإيثانويك بوجود P_2O_5 كمادة محفزة . ص 108

½-¼-¼



(ملاحظة : المطلوب كتابة المعادلة صحيحة و ليس بالضرورة موزونة)

نموذج الإجابة

تابع / السؤال السادس :

(ج) استعن بالجدول التالي وأجب عما يلي : ص 87 (1-1 x 1)

الاسم	الصيغة التركيبية	الكتلة المولية g/mol	درجة الغليان (°C)
ثاني ميثيل إيثر	CH ₃ -O-CH ₃	46	-23.7
الإيثانول	CH ₃ -CH ₂ -OH	46	78.3

ماذا يحدث لمكونات خليط يحتوي على : الإيثانول ، و ثاني ميثيل إيثر ، عند تسخينهما ابتداء من درجة حرارة تتراوح من (-25°C) إلى درجة حرارة (79°C) .

½

المركب الذي يغلي أولاً هو : ثاني ميثيل إيثر

التفسير : درجات غليان الكحولات أعلى من درجات غليان الإيثرات المتقاربة معها في الكتل المولية بسبب قدرة الكحولات على تكوين روابط هيدروجينية بين جزيئاتها .

½

(د) ماذا تتوقع أن يحدث في الحالات التالية مع التفسير : ص 29 (1-1 x 1)

عند إضافة محلول الأمونيا إلى محلول هيدروكسيد النحاس II شحيح الذوبان في الماء .


½

• التوقع : يذوب الراسب

• السبب : بسبب تكوّن الأيون المترابك أو تكوّن $[Cu(NH_3)_2]^{2-}$

وبالتالي تصبح قيمة الحاصل الأيوني لهيدروكسيد النحاس II من قيمة ثابت حاصل الإذابة .

½



درجة السؤال السادس

انتهت الأسئلة