

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج الكويتية



التوجيه الفني العام للعلوم

الملف بنك أسئلة التوجيه الفني للوحدة الأولى (الحركة)

موقع المناهج ← المناهج الكويتية ← الصف الحادي عشر العلمي ← فيزياء ← الفصل الأول

روابط مواقع التواصل الاجتماعي بحسب الصف الحادي عشر العلمي



روابط مواد الصف الحادي عشر العلمي على تلغرام

[الرياضيات](#)

[اللغة الانجليزية](#)

[اللغة العربية](#)

[التربية الاسلامية](#)

المزيد من الملفات بحسب الصف الحادي عشر العلمي والمادة فيزياء في الفصل الأول

توزيع الحصص الإفتراضية (المتزامنة وغير المتزامنة)	1
احابة بنك اسئلة الوحدة الاولى في مادة الفيزياء	2
بنك اسئلة الوحدة الاولى في مادة الفيزياء	3
القوة الجاذبة المركزية في مادة الفيزياء	4
وصف الحركة الدائرية في مادة الفيزياء	5



وزارة التربية
التوجيه العام للعلوم

بنك الأسئلة لمادة الفيزياء

موقع
المنهج الكويتية
almanahj.com/kw

الصف الحادي عشر علمي

الفصل الدراسي الأول

للعام الدراسي 2022 / 2023 م



فريق بنك 11 مع فيزياء

الموجه الفني العام للعلوم
الأستاذة : منى الأنصاري



مُعْتَمَد

الوحدة الأولى: الحركة

الفصل الأول: حركة المقذوفات

الدرس (1-1) الحركة (الكميات العددية - الكميات المتجهة)

السؤال الأول:

أكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية:


- 1- الكميات التي يكفي لتحديد عددها مقدارها، ووحدة فيزيائية تميز هذا المقدار.
(.....)
- 2- الكميات التي تحتاج في تحديدها إلى الاتجاه الذي تتخذه، بالإضافة إلى العدد الذي يحدد مقدارها ووحدة القياس التي تميزها.
(.....)
- 3- المسافة الأقصر بين نقطة بداية الحركة ونقطة نهايتها، وباتجاه من نقطة البداية إلى نقطة النهاية.
(.....)
- 4- عملية تركيب، تتم فيها الاستعاضة عن متجهين أو أكثر بمتجه واحد.
(.....)

السؤال الثاني:

ضع بين القوسين علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة علمياً، وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة: علمياً


في كل مما يلي:

- 1- () تُصنف القوة كمتجه حر ، حيث يمكن نقلها دون تغيير قيمته او اتجاهه.
- 2- () الإزاحة كمية عددية بينما المسافة كمية متجهة .
- 3- () يطير صقر أفقياً بسرعة m/s (40) باتجاه الشرق ، فإذا هبت عليه أثناء طيرانه رياح معاكسة (نحو الغرب) سرعتها m/s (10) ، فإن مقدار سرعته المحصلة بالنسبة لمراقب على الأرض تساوي (30) m/s .



- 4- () الشكل المقابل يمثل متجهين متعامدين ومتساويين مقداراً ، مقدار كل منهما $(20) N$ ، فإن محصلتهما تساوي $(20) N$.

- 5- () يكون مقدار محصلة متجهين متساويين مقداراً مساوية مقداراً لمجموعهما إذا كانت الزاوية المحصورة بينهما (120°) .




- 6- () إذا قارنا المتجهين (\vec{a}) ، (\vec{b}) في الشكل المقابل ، فإن $(\vec{b} = -2\vec{a})$.

- 7- () عند ضرب كمية عددية موجبة \times كمية متجهة يكون حاصل الضرب متجه جديد في نفس اتجاه الكمية المتجهة الأولى.

- 8- () حاصل الضرب القياسي لمتجهين يتوقف علي مقدار المتجهين والزاوية المحصورة بينهما .
- 9- () حاصل الضرب القياسي لمتجهين يساوي صفرًا إذا كانت الزاوية المحصورة بينهما قائمة (90°) .
- 10- () حاصل الضرب الاتجاهي لمتجهين يتوقف علي مقدار المتجهين والزاوية المحصورة بينهما .
- 11- () حاصل الضرب الاتجاهي لمتجهين متوازيين يساوي صفرًا .

معتاداً

12- () مقدار حاصل الضرب القياسي لمتجهين يُمثل بمساحة متوازي الأضلاع الناشئ عن المتجهين .



13- () الشكل المقابل يمثل متجهان (\vec{a} ، \vec{b}) متعامدان وفي مستوي أفقي

واحد ، فيكون المتجه الناتج من ضربهما خارجياً ($\vec{a} \times \vec{b}$) هو المتجه

(\vec{C}) .

السؤال الثالث:

أكمل العبارات التالية بما تراه مناسباً:-

1- تكون محصلة متجهين أكبر ما يمكن عندما تكون الزاوية المحصورة بينهما

(بالدرجات) تساوي ، و تكون أصغر ما يمكن عندما تكون الزاوية (بالدرجات) تساوي

المنهج الكويتية
almanahj.com/kw

2- إذا كان لمتجهين نفس المقدار ونفس الاتجاه فإنهما يكونا

3- تتوقف محصلة أي متجهين على مقدار كل من المتجهين و

4- محصلة متجهين متساويين مقداراً تساوي مقدار أي منهما إذا كانت الزاوية المحصورة بينهما (بالدرجات)

تساوي

5- الصيغة الرياضية للقانون الثاني لنيوتن هي $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ ، ولان الكتلة دائماً موجبة فيكون اتجاه متجه القوة

..... اتجاه متجه العجلة.

6- إذا كان حاصل الضرب القياسي لمتجهين متساويين يساوي مربع أي منهما، فإن الزاوية المحصورة بينهما

تساوي بالدرجات

7- إذا كان حاصل الضرب الاتجاهي لمتجهين متساويين يساوي مربع أي منهما، فإن الزاوية المحصورة بينهما

تساوي بالدرجات

8- إذا كان حاصل الضرب القياسي لمتجهين متساويين يساوي مقدار حاصل الضرب الاتجاهي لنفس

المتجهين، فإن الزاوية المحصورة بينهما تساوي بالدرجات

معتاد

السؤال الرابع:

ضع علامة (✓) في المربع الواقع أمام أنسب إجابة لكل من العبارات التالية :-

1- وحدة فقط من الكميات الفيزيائية التالية تُصنف ككمية قياسية وهي:



- الإزاحة المسافة القوة العجلة

2- وحدة فقط من الكميات المتجهة التالية تُصنف كمتجه مقيد وهي :

- الإزاحة السرعة المتجهة القوة العجلة

3- الشكل المقابل يمثل متجهين غير متساويين في اتجاه واحد، فإذا تغيرت الزاوية بين المتجهين فان محصلتهما

تصبح أقل ما يمكن عندما يصبحا كما في الشكل:




4 - دفع لاعب الكرة باتجاه المرمي في إحدى مباريات كرة القدم بسرعة (80) km/h ، ولكن الكرة وصلت

لحارس المرمي بسرعة (90) km/h ، ومن ذلك نستنتج أن :

- الكرة تتحرك في عكس اتجاه الرياح بسرعة (10) km/h .
 الكرة تتحرك في اتجاه الرياح بسرعة (10) km/h .
 الكرة تتحرك عمودية على اتجاه الرياح بسرعة (10) km/h .
 الكرة تتحرك في عكس اتجاه الرياح بسرعة (70) km/h .

5- محصلة المتجهين الموضحين بالشكل المقابل تساوي:



(7)N وتضع زاوية 45° مع F1 (1)N وتضع زاوية 45° مع F1

(5)N وتضع زاوية 36.87° مع F2 (5)N وتضع زاوية 36.87° مع F1

6- متجهان متساويان ومتوازيان حاصل ضربهما القياسي (25) N ، فإن مقدار

محصلتهما بوحدة (N) تساوي:

- صفرا 5 10 25

7- متجهان متساويان ومتوازيان حاصل ضربهما القياسي (25) N ، فإن مقدار ضربهما الاتجاهي بوحدة

(N) يساوي :

- صفرا 5 10 25






8 - إحدى القيم التالية لا يمكن أن تمثل محصلة متجهين (a = 10)N ، (b = 8)N وهي:

- 2 9 18 20

معتاد

9- إذا كان الشكل المقابل يمثل المتجه (\vec{A}) ، فإن الشكل الصحيح الذي يمثل المتجه $(-2\vec{A})$

هو:



السؤال الخامس:

(أ) قارن بين كل مما يلي حسب وجه المقارنة المطلوب في الجدول التالي :

الكمية المقيدة	الكمية العددية (القياسية)	وجه المقارنة
.....	التعريف
.....	مثال واحد فقط
المتجه المقيد	المتجه الحر	وجه المقارنة
.....	امكانية نقله
المسافة	الإزاحة	وجه المقارنة
.....	نوع الكمية الفيزيائية
الضرب الاتجاهي لمتجهين	الضرب القياسي لمتجهين	وجه المقارنة
.....	العلاقة الرياضية
.....	نوع الكمية الناتجة

(ب) : أذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من :

1- حاصل الجمع الاتجاهي لمتجهين (محصلة المتجهين).

.....

2- حاصل الضرب القياسي لمتجهين.

.....

3- حاصل الضرب الاتجاهي لمتجهين.

.....

معتاد

(ج) : علل لكل مما يلي تعليلاً علمياً سليماً :

1- يمكن نقل متجه الإزاحة، بينما لا يمكن نقل متجه القوة.

2- تتغير السرعة التي تُحلق بها طائرة في الجو على الرغم من ثبات السرعة التي يكسبها المحرك للطائرة.


السؤال السادس:

حل المسائل التالية:

(أ) تتحرك سيارة بسرعة 150 km/h باتجاه يصنع زاوية مقدارها (130°) مع المحور الأفقي الموجب.

المطلوب:

* أكتب الصيغة الرياضية المعبرة عن متجه السرعة.



(ب) الشكل المقابل يمثل متجهان (\vec{a}) ، (\vec{b}) في مستوى

أفقي واحد هو مستوى الصفحة والمطلوب حساب:

1 - محصلة المتجهين (مقداراً واتجاهاً) بالطريقة الحسابية.

2 - حاصل الضرب الاتجاهي $(\vec{a} \times \vec{b})$ للمتجهين (مقداراً واتجاهاً).

3 - حاصل الضرب الداخلي $(\vec{a} \cdot \vec{b})$ للمتجهين.

(ج) قوتان $(\vec{F}_1 = 50\text{N})$ ، $(\vec{F}_2 = 20\text{N})$... ما مقدار أكبر محصلة للقوتين؟ و ما مقدار أصغر محصلة

للقوتين؟ أذكر متى نحصل على هذين المقدارين.

معتاد

الوحدة الأولى: الحركة

الفصل الأول: حركة المقذوفات

الدرس (1-2) تحليل المتجهات

السؤال الأول:

أ- أكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية :

1- استبدال متجه ما بمتجهين متعامدين يسميان مركبتي المتجه. (.....)

ب- أكمل العبارات العلمية التالية:


1- إذا كانت قيمة المركبة الأفقية لقوة تصنع زاوية (45°) مع محور الإسناد (X) تساوي (10N) فإن

قيمة المركبة الرأسية للقوة بوحدة النيوتن تساوي

2- العملية المعاكسة لعملية جمع المتجهات تسمى

3- القوة (F) في الشكل المقابل بوحدة (N) تساوي وتصنع زاوية

مقدارها مع المحور الموجب للسينات .



ج- ضع علامة (✓) في المربع الواقع أمام أنسب إجابة لكل من العبارات التالية :-

1- إذا كانت محصلة متجهين متعامدين تساوي (20N) والمركبة الأفقية لهذه المحصلة تساوي (10N) فتكون

الزاوية المحصورة بين المركبة الرأسية والمحصلة بوحدة الدرجات تساوي :

120

90

60

30


2- إذا كان متجه (a) يصنع مع الأفق زاوية (θ) فإن مركبته بالاتجاه الرأسي (a_y) تساوي :

$\frac{a}{\cos \theta}$

$\frac{a}{\sin \theta}$

$a \cos \theta$

$a \sin \theta$



3- تكون قيمة القوة (F) بوحدة النيوتن في الشكل المقابل تساوي :

10

5


40

20

معتاد

السؤال الثاني:

أحسب المركبة الأفقية والمركبة الرأسية لكل قوة من القوى الموضحة بالشكل:



أ) أحسب مقدار القوة المحصلة واتجاهها في الحالة التالية .

$$F_y = 12 \text{ N}, F_x = 5 \text{ N}$$

.....

ب) جسم مستقر على مستوى مائل أملس يميل على الأفق بزاوية (30°) فإذا كان وزن الجسم (50)N أحسب كل من مركبتي وزن الجسم.

.....

ج) إذا كانت مركبتي متجه ما $(v_x = 6 \text{ Unit})$ $(v_y = 8 \text{ Unit})$...، أحسب:


1- مقدار المتجه.

.....

2- الزاوية التي تصنعها المتجه مع المركبة الأفقية.

.....

معتاد



د) أحسب محصلة القوى الموضحة بالشكل المقابل .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

معتاد

الوحدة الأولى: الحركة

الفصل الأول: حركة المقذوفات

الدرس (1-3) حركة القذيفة

السؤال الأول:

أ- أكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية :

- 1- الأجسام التي تقذف أو تطلق في الهواء وتتعرض لقوة جاذبية الأرض . (.....)
- 2- علاقة بين مركبة الحركة الأفقية ومركبة الحركة الرأسية خالية من متغير الزمن. (.....)
- 3- المسافة الأفقية التي تقطعها القذيفة بين نقطة الإطلاق ونقطة الوصول على الخط الأفقي المار بنقطة الإطلاق. (.....)

ب- ضع بين القوسين علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة علمياً ، وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة:

- (1) () مركبة حركة القذيفة في الاتجاه الأفقي تكون بسرعة ثابتة (عند إهمال الاحتكاك) .
- (2) () مركبتا الحركة الأفقية للقذيفة والحركة الرأسية مترابطتين .
- (3) () يتغير شكل مسار القذيفة وتتباطأ سرعتها نتيجة الاحتكاك مع الهواء .
- (4) () إذا كانت زاوية الإطلاق للقذيفة بالنسبة إلي المحور الأفقي تساوي (90°) فإن شكل المسار يكون نصف قطع مكافئ .
- (5) () يتناقص مدى القذيفة ويصبح المسار قطعاً مكافئاً غير حقيقي عند إهمال مقاومة الهواء .
- (6) () إذا قذف جسم بسرعة ابتدائية مقدارها 20m/s في اتجاه يصنع مع الأفق زاوية مقدارها (30°) فإن مركبة سرعته الابتدائية في الاتجاه الرأسي 14m/s .
- (7) () قذف جسم إلى أعلى بزاوية مقدارها (30°) فإذا كانت مركبة سرعته في الاتجاه الأفقي تساوي $8\sqrt{3}\text{m/s}$ فإن السرعة التي قذف بها تساوي 16m/s .
- (8) () عند إطلاق عدة قذائف بالسرعة نفسها ومن نفس نقطة القذف ، وبإهمال مقاومة الهواء فإن كل قذيفتين يصلان للمدى نفسه عند إطلاقهما بزاويتين مجموعهما (90°) .
- (9) () عند التعويض في معادلة المسار بزاوية ($\theta = 90^\circ$) فإن مسار القذيفة يكون نصف قطع مكافئ
- (10) () المركبة الرأسية للسرعة التي يقذف بها الجسم المقذوف بزاوية مع الأفق هي التي تحدد الارتفاع
- (11) () الرأسي وزمن التحليق .
- (12) () عند وصول القذيفة إلى أقصى ارتفاع ، تكون قد قطعت ضعف المدى الأفقي .
- (13) () عند إطلاق قذيفة بزاوية تساوي صفراً فإن ذلك يعني أن سرعتها الأفقية الابتدائية هي أفقية فقط .
- (14) () يكون اتجاه المركبة الرأسية لسرعة مقذوف بعد مروره بالنقطة التي تمثل أقصى ارتفاع لأسفل .
- (15) () عند غياب تأثير الهواء على حركة القذيفة لا يتغير شكل مسارها ومقدار المدى الأفقي .

معتاد

ج- أكمل العبارات التالية بما تراه مناسباً :-

- 1- حركة القذيفة هي حركة مركبة من حركة رأسية وتكون علي المحور الرأسي، وحركة أفقية وتكون علي المحور الأفقي .
- 2- عند غياب الاحتكاك تكون القوة الوحيدة المؤثرة علي كتلة الجسم المقذوف هي قوة واتجاهها يكون نحو
- 3- المركبة الأفقية لسرعة الجسم المقذوف علي مسار القطع المكافئ تكون..... المقدار ، بينما تكون السرعة الرأسية المقدار .
- 4- إذا كانت زاوية إطلاق القذيفة بالنسبة للمحور الأفقي تساوي (90°) فإن مسار القذيفة يصبح..... ، بينما يكون علي شكل مسار إذا كانت زاوية الإطلاق تساوي (0°) .
- 5- عندما تقذف قذيفة بزاوية (θ) مع المحور الأفقي، وعندما تصل إلى أقصى ارتفاع تكون قد قطعت..... المدى الأفقي.
- 6- قذفت كرة بسرعة ابتدائية مقدارها 30m/s باتجاه يصنع مع المحور الأفقي زاوية مقدارها (60°) فوصلت إلى أقصى ارتفاع لها بعد (3s) ، فتكون سرعتها الرأسية عند ذلك الارتفاع بوحدة m/s
- 7- جسم قذف بزاوية (60°) فإنه يصل إلى المدى نفسه الذي يصل إليه إذا تم إطلاقه بالسرعة نفسها ومن نفس النقطة ولكن بزاوية مقدارها..... .
- 8- قذفت كرة بسرعة متجهة مقدارها 40m/s في اتجاه يصنع زاوية (30°) ، فإن زمن تحليقها عندما تعود إلى المستوى نفسه الذي قذفت منه يساوي..... ثانية.
- 9- أطلقت قذيفتان كتلتها (m) ، ($2m$) بالسرعة الابتدائية نفسها وبزاوية (θ) بالنسبة إلى المحور الأفقي نفسه فيكون مدي المسار للقذيفة ($2m$) مدي المسار للقذيفة (m) .
- 11- قذفت كرة بسرعة متجهة مقدارها 30m/s في اتجاه يصنع زاوية (30°) ، وبإهمال مقاومة الهواء يكون أقصى ارتفاع تصل إليه القذيفة بوحدة (m)


معتاد

السؤال الثاني:

ضع علامة (✓) في المربع الواقع أمام أنسب إجابة لكل من العبارات التالية :-

- 1- قذف حجر من ارتفاع 80m عن سطح الأرض بسرعة أفقية (v) وكانت إزاحة الجسم الأفقية تساوي 40m ، فإن مقدار السرعة الأفقية بوحدة m/s تساوي :
- 5 10 20 40
- 2- يكون شكل مسار قذيفة أطلقت بزاوية مع المحور الأفقي على شكل مسار نصف قطع مكافئ عندما تكون الزاوية بالدرجات مساوية:
- 0 45 60 90
- 3- أطلقت قذيفة بزاوية (30°) مع المحور الأفقي وبسرعة ابتدائية 40m/s ، فإن الزمن الذي تستغرقه القذيفة للوصول إلى أقصى ارتفاع بوحدة الثانية يساوي:
- 2 1.732 3.46 4
- 4- في السؤال السابق يكون أقصى ارتفاع تصل إليه القذيفة بوحدة (m) يساوي:
- 5 10 20 40
- 5- في السؤال السابق يكون المدى الأفقي الذي تبلغه القذيفة عند اصطدامها بالأرض عند نقطه تقع على الخط المار بنقط القذف بوحدة (m) يساوي:
- 80 160 138.56 346.41
- 6 - أطلقت قذيفتان بسرعة ابتدائية متساوية من نفس النقطة، الأولى بزاوية (30°) والثانية بزاوية (60°) فتكون المركبة الرأسية لسرعة القذيفة الأولى:
- مساوية المركبة الرأسية لسرعة القذيفة الثانية. مثلي المركبة الرأسية لسرعة القذيفة الثانية.
- أكبر من المركبة الرأسية لسرعة القذيفة الثانية. أصغر من المركبة الرأسية لسرعة القذيفة الثانية.
- 7 - أطلقت قذيفتان بسرعة ابتدائية متساوية، الأولى بزاوية (30°) والثانية بزاوية (60°) فتكون المركبة الأفقية لسرعة القذيفة الأولى:
- مساوية المركبة الأفقية لسرعة القذيفة الثانية. مثلي المركبة الأفقية لسرعة القذيفة الثانية.
- أكبر من المركبة الأفقية لسرعة القذيفة الثانية. أصغر من المركبة الأفقية لسرعة القذيفة الثانية.
- 8 - كرتان قذفت أحدهما أفقياً والأخرى أسقطت رأسياً في الوقت نفسه ، بإهمال مقاومة الهواء فإن :
- الكرتان تصلان إلى سطح الأرض في نفس اللحظة.
- الكرة التي تقذف أفقياً تصل إلى سطح الأرض أولاً.
- الكرة التي أسقطت رأسياً تصل إلى سطح الأرض أولاً.
- الكرة التي تقذف أفقياً تستغرق نصف زمن وصول الكرة التي أسقطت رأسياً .

مقتمل



9 - أطلقت قذيفة بزاوية (θ) مع المحور الأفقي كما في الشكل المجاور

فتكون مركبة السرعة الأفقية للقذيفة عند نقطة (c):

- مساوية مركبة السرعة الأفقية عند نقطة (G).
 أكبر من مركبة السرعة الأفقية عند نقطة (G).
 أصغر من مركبة السرعة الأفقية عند نقطة (G).
 للصفر.

10 - في السؤال السابق تكون مركبة السرعة الرأسية للقذيفة عند نقطة (c):

- مساوية مركبة السرعة الرأسية للقذيفة عند نقطة (G).
 أكبر من مركبة السرعة الرأسية للقذيفة عند نقطة (G).
 أصغر من مركبة السرعة الرأسية للقذيفة عند نقطة (G).
 للصفر.

11 - للحصول علي أكبر مدي أفقي ممكن لقذيفة تطلق من مدفع، يجب أن تكون زاوية القذف (θ) مع المحور

الأفقي مساوية بالدرجات:

- 0 30 45 60

12 - قذفت كرة بزاوية (45°) مع المحور الأفقي وكانت مركبة سرعته الأفقية مساوية $(20)m/s$ ، فتكون قيمة

هذه السرعة على ارتفاع $(2)m$ بوحدة m/s مساوية:

- 0 10 20 40

13 - أطلقت قذيفة بزاوية (45°) مع المحور الأفقي وبسرعة ابتدائية مقدارها $(20\sqrt{2})m/s$ فإن مقدار سرعة

القذيفة لحظة اصطدامها بسطح الأرض بوحدة m/s تساوي:

- 14.14 20 28.28 56.56

14-أطلقت قذيفتان كتلتها (m) ، $(2m)$ بالسرعة الابتدائية نفسها وبزاوية (θ) بالنسبة إلى المحور الأفقي

نفسه فيكون الارتفاع الرأسي الذي تبلغه القذيفة $(2m)$:

- مساويا الارتفاع الرأسي الذي تبلغه القذيفة (m) .
 ربع الارتفاع الرأسي الذي تبلغه القذيفة (m) .
 نصف الارتفاع الرأسي الذي تبلغه القذيفة (m) .
 مثلي الارتفاع الرأسي الذي تبلغه القذيفة (m) .

15-أطلقت قذيفة بزاوية (45°) مع المحور الأفقي، وبسرعة ابتدائية مقدارها $(10)m/s$ وبإهمال مقاومة

الهواء واعتبار عجلة الجاذبية الأرضية تساوي $(10)m/s^2$. فتكون معادلة مسار القذيفة:

- $y = x - 0.2x^2$ $y = x - 0.1x^2$
 $y = x - 0.1x^2$ $y = x - 0.707x^2$

معتاد

- 16- أطلقت قذيفتان كتلتها (m) ، $(2m)$ بالسرعة الابتدائية نفسها، وبزاويتي إطلاق مختلفتين الأولي بزاوية (30°) والثانية بزاوية (60°) بالنسبة إلى المحور الأفقي نفسه فيكون المدى الأفقي للقذيفة (m) .
- نصف المدى الأفقي للقذيفة $(2m)$. مساوياً المدى الأفقي للقذيفة $(2m)$.
- مثلي المدى الأفقي للقذيفة $(2m)$. أربعة أمثال المدى الأفقي للقذيفة $(2m)$.

السؤال الثالث:

(أ) : قارن بين كل مما يلي حسب وجه المقارن المطلوب في الجدول التالي :

وجه المقارنة	المحور الرأسي	المحور الأفقي
نوع الحركة لجسم مقذوف بزاوية (θ)
عجلة جسم مقذوف بزاوية (θ)
وجه المقارنة	صفر	90°
شكل مسار قذيفة عندما تطلق بزاوية مع المحور الأفقي
وجه المقارنة	أقصى ارتفاع	المدى الأفقي
العلاقة الرياضية لجسم مقذوف بزاوية (θ)
وجه المقارنة	السرعة الأفقية	السرعة الرأسية
العلاقة الرياضية لجسم مقذوف بزاوية

(ب) : أذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من :

1- معادلة المسار لقذيفة أطلقت بزاوية (θ) مع المحور الأفقي.

.....

2- أقصى ارتفاع تبلغه قذيفة أطلقت بزاوية (θ) مع المحور الأفقي.

.....

معتاد

3- المدى الأفقي لقذيفة أطلقت بزاوية (θ) مع المحور الأفقي.

4- شكل مسار قذيفة أطلقت بزاوية (θ) مع المحور الأفقي.

(ج) : علل لكل مما يلي تعليلاً علمياً سليماً :

1- عدم وجود عجلة أفقية للجسم المقذوف بزاوية (θ) مع المحور الأفقي.

2- يتغير مسار القذيفة بتغيير زاوية الإطلاق بالنسبة إلى المحور الأفقي.



(د) : فسر مايلي

1- أطلقت قذيفتان كتلتها (m) ، $(2m)$ بالسرعة الابتدائية نفسها، وبزاوية (θ) مع المحور الأفقي فيكون المدى الأفقي للقذيفة (m) يساوي المدى الأفقي للقذيفة $(2m)$

2- أطلقت قذيفتان بالسرعة الابتدائية نفسها، وبزاويتي إطلاق مختلفتين الأولى بزاوية (30°) والثانية بزاوية (60°) بالنسبة إلى المحور الأفقي نفسه فإن القذيفة التي أطلقت بزاوية (60°) تصل إلى ارتفاع أكبر.

(ه) : ماذا يحدث في الحالات التالية

1- مقدار سرعة قذيفة أطلقت بزاوية (θ) نتيجة الاحتكاك مع الهواء.

2- لمقدار سرعة كرة تتحرك على سطح أفقي عديم الاحتكاك.

3- لمسار قذيفتين يتم إطلاقهما بالسرعة نفسها وبزاويتي (15°) ، (75°) بالنسبة إلى المحور الأفقي بفرض إهمال مقاومة الهواء.

معتاد

السؤال الرابع:

حل المسائل التالية: -

(أ) قذفت كرة بسرعة أفقية مقدارها 15m/s من ارتفاع 80m عن سطح الأرض. بإهمال مقاومة الهواء واعتبار عجلة الجاذبية الأرضية 10m/s^2 . أحسب ما يلي:
1- الزمن المستغرق لوصول الكرة إلى سطح الأرض.

2- الإزاحة الأفقية للكرة.

(ب) أطلقت قذيفة بزاوية (45°) مع المحور الأفقي بسرعة $5\sqrt{2}\text{m/s}$. بإهمال مقاومة الهواء والمطلوب:
1 - أكتب معادلة المسار للقذيفة.

2 - أحسب الزمن الذي تبلغه القذيفة للوصول إلى أقصى ارتفاع.

3 - أحسب المدى الأفقي الذي تبلغه القذيفة علما بأنها اصطدمت بالأرض عند نقطة تقع على الخط المار بنقطة القذف.

4- احسب متجه السرعة لحظة اصطدام القذيفة بالأرض.

مُعْتَمَد

الوحدة الأولى: الحركة

الفصل الثاني: الحركة الدائرية

الدرس (1-2) الحركة الدائرية

السؤال الأول:


أ- أكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية :

- 1- حركة الجسم على مسار دائري حول مركز دوران، مع المحافظة على مسافة ثابتة منه. (.....)
- 2- الخط المستقيم الذي تحدث حوله الحركة الدائرية . (.....)
- 3- حركة جسم يدور حول محور داخلي . (.....)
- 4- حركة جسم يدور حول محور خارجي . (.....)
- 5- طول القوس المقطوع خلال وحدة الزمن. (.....)
- 6- مقدار الزاوية بالراديان التي يمسخها نصف القطر في وحدة الزمن. (.....)
- 7- عدد الدورات في وحدة الزمن. (.....)
- 8- تغير السرعة الزاوية (ω) خلال وحدة الزمن. (.....)
- 9- الزمن الذي يستغرقه الجسم ليدور دورة كاملة على محيط دائرة الحركة. (.....)

ب- ضع بين القوسين علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة علمياً، وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة

علمياً في كل مما يلي :

- () 1 عندما يتحرك جسم في مسار دائري بسرعة ثابتة المقدار تكون حركته دائرية منتظمة .
- () 2 حركة الأرض حول الشمس هي حركة دائرية محورية (مغزلية) لأنها تدور حول محور خارجي .



() 3 الجسم الموضح بالشكل المقابل يتحرك على مسار دائري ، والمتجهات تمثل

السرعة الخطية للجسم ، فتكون حركة هذا الجسم حركة دائرية غير منتظمة.

() 4 الراديان وحده قياس السرعة الخطية في الحركة الدائرية المنتظمة .

() 5 السرعة الخطية في الحركة الدائرية هي الزاوية التي يمسخها نصف قطر الدائرة

خلال وحدة الزمن


() 6 كلما زادت سرعة الجسم الخطية على مسار دائري ثابت ، فإن الزمن الدوري للحركة يقل .

() 7 السرعة المماسية لجسم يتحرك على مسار دائري ثابت نصف القطر تتناسب طردياً مع السرعة

الدائرية.


() 8 الشكل المقابل يمثل كرتان (a ، b) مربوطتان في خيط واحد ، ويدور

الخيط حول محور (c) ، فإن السرعة الخطية للكرتين تكون متساوية.



معتاد

(9) () السرعة الخطية تكون غير منتظمة لجسم يتحرك حركة دائرية منتظمة لأنها متغيرة الاتجاه لحظياً.




(10) () أثناء دوران أسطوانة التسجيل الموضحة بالشكل المقابل حول المحور الرأسي ، تكون السرعة الخطية للعلبتين الموضوعتين على سطحها متساويتين .

(11) () أثناء دوران أسطوانة التسجيل الموضحة بالشكل السابق حول المحور الرأسي ، تكون السرعة الزاوية للعلبتين الموضوعتين علي سطحها متساويتين .

(12) () تتعدم السرعة الخطية (المماسية) عند مركز المسطح الدائري والعمودي مع محوره ، ولا تتلاشي السرعة الزاوية .

(13) () يتحرك جسم علي مسار دائري منتظم نصف قطره (20) cm ، فإذا كان زمنه الدوري يساوي (2) s فإن سرعته الخطية تساوي بوحدة (0.4) m/s .

(14) () يتحرك جسم حركة دائرية منتظمة بحيث يعمل دورة واحدة كل ثانية فإن سرعته الزاوية تساوي $(2\pi) \text{ Rad / s}$.



(15) () الشكل المقابل يمثل كرة مصممة مربوطة بخيط غير مرن ، وتدور في مسار دائري رأسي ، فإذا أُنقطع الخيط لحظة وجود الكرة عند ذروة مسارها (a) فإن الكرة سوف تسقط سقوطاً حراً بتأثير الجاذبية الأرضية .

(16) () الجسم المتحرك علي مسار دائري حركة دائرية منتظمة تكون حركته بعجلة ثابتة المقدار وفي اتجاه مركز الحركة دائماً .

(17) () الجسم المتحرك علي مسار دائري حركة دائرية منتظمة تكون عجلته المماسية تساوي صفراً .

(18) () العجلة المركزية لجسم يتحرك علي مسار دائري ثابت نصف القطر تتناسب طردياً مع مربع سرعته المماسية .

(19) () الجسم المتحرك علي مسار دائري حركة دائرية منتظمة تكون عجلته الزاوية تساوي صفراً .


(20) () الزمن الدوري لجسم يتحرك حركة دائرية منتظمة يتناسب طردياً مع تردده .

ج- أكمل العبارات التالية بما تراه مناسباً :-

(1) عندما يتحرك جسم علي مسار دائري ويقطع أقواساً متساوية في أزمنة متساوية فإن سرعته العددية (الخطية / المماسية) تكون المقدار .

(2) تصنف الحركة الدائرية إلي نوعين هما حركة عندما يدور الجسم حول محور داخلي ، و حركة عندما يدور الجسم حول محور خارجي .

مُعْتَمَد




- (3) يتحرك عقرب الثواني في الساعة الموضحة بالشكل المقابل وطوله cm (2) في مسار دائري بالاتجاه الدائري السالب من رقم (12) إلى رقم (3) ويقطع خلال ذلك قوساً طوله بوحدة (cm) يساوي
- (4) السرعة المماسية في الحركة الدائرية تتناسب مع السرعة الزاوية (الدائرية) عند ثبوت نصف القطر.

- (5) إذا زاد نصف القطر لجسم يتحرك في مسار دائري لمثلي ما كان عليه (بفرض ثبات سرعته الزاوية) ، فإن سرعته الخطية

- (6) متجه العجلة المركزية في الحركة الدائرية يكون دائماً متجه السرعة المماسية .

- (7) تردد الجسم المتحرك حركة دائرية منتظمة يتناسب مع زمنه الدوري .

- (8) يتحرك جسم علي مسار دائري بسرعة زاوية مقدارها $\left(\frac{\pi}{4}\right) \text{rad/s}$ ، فإن زمنه الدوري بوحدة (s) يساوي



- (9) العجلة الزاوية للجسم المتحرك في المسار الدائري الموضح بالشكل المقابل بوحدة (rad/s^2) تساوي

(9)

وحدة القياس	الرمز	الكمية	وحدة القياس	الرمز	الكمية
		السرعة الزاوية			الإزاحة الزاوية
		العجلة المركزية			السرعة الخطية
		العجلة الزاوية			طول القوس
		الزمن الدوري			التردد

السؤال الثاني:

ضع علامة (✓) في المربع الواقع أمام أنسب إجابة لكل من العبارات التالية :-

- (1) إذا دار جسم على مسار دائري، ومسح نصف قطره زاوية مقدارها (30°) ، فإن مقدار هذه الزاوية (بالراديان) يساوي:

$\frac{\pi}{2}$

$\frac{\pi}{4}$

$\frac{\pi}{6}$


$\frac{\pi}{8}$

معتاد

(2) نعيش علي أحد كواكب المجموعة الشمسية وهو كوكب الأرض ، وهو في حركة دائمة ينتج عنها كثير من الظواهر الطبيعية مثل ظاهرة تعاقب الليل والنهار التي تسببها حركة الأرض :

a. الدورانية الاهتزازية المدارية المغزلية

(3) إذا كان طول القوس في الشكل المقابل (2.093) m ، ونصف قطر المسار (1m) فإن الإزاحة الزاوية بوحدة الراديان تساوي :




$\frac{2\pi}{3}$

$\frac{\pi}{4}$

$\frac{\pi}{2}$

$\frac{3\pi}{4}$

(b) في الشكل



(4) النسبة بين السرعة الخطية للجسم (a) و السرعة الخطية للجسم المقابل { $v_a : v_b$ } تساوي :

1 : 2

2 : 1

1 : 1

4 : 1

(5) تدور لاعبة الباليه علي الجليد في مسار دائري نصف قطره (10) m وبسرعة زاوية مقدارها (0.6) rad/s ، فإن سرعتها المماسية بوحدة (m/s) تساوي :





16.

6

0.6

0.06

(6) في لعبة دوارة الخيل ، يجلس مجموعة من الأطفال علي أحصنة مختلفة البعد عن مركز الدوران ، وأفضل خط بياني يمثل تغيرات السرعة المماسية لكل منهم باختلاف بعده عن محور الدوران هو :



(7) في الحركة في الدائرية المنتظمة تكون السرعة المماسية للجسم :

ثابتة المقدار و متغيرة الاتجاه .


ثابتة المقدار والاتجاه .

متغيرة المقدار وثابتة الاتجاه .

متغيرة المقدار والاتجاه .

معتاد

(8) أفضل مخطط يوضح العلاقة بين متجه السرعة الخطية و متجه العجلة في الحركة الدائرية المنتظمة هو:



(9) حجر مربوط في طرف خيط طوله $m (0.5)$ ويدور في مستوى أفقي محدثاً (25) دورة خلال (5) ثواني ، فإن السرعة الزاوية للحجر بوحدة (rad/s) تساوي :

- 314 31.4 3.14 0.314

(10) حجر مربوط بخيط ويدور حركه دورانية منتظمة في مستوى أفقي فإذا قطع الخيط فان الحجر :

- يستمر بحركته حول المركز بنفس السرعة يستمر بحركته حول المركز بسرعة اقل
 يسقط مباشرة على الأرض يتحرك بخط مستقيم باتجاه السرعة الخطية


(11) يتحرك جسم في مسار دائري منتظم نصف قطره (100) cm بحيث كان زمنه الدوري يساوي $s (2)$ فإن سرعته الخطية بوحدة (m/s) وبدلالة (π) تساوي

- 10π 2π π 0.5π

(12) عندما تدور مروحة بسرعة زاوية مقدارها $\text{Rad/s} (60\pi)$ فإن زمنها الدوري (بالثانية) يساوي :

- $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{30}$ $\frac{1}{60}$ 30

(13) أفضل مخطط يمثل العلاقة بين تردد جسم وزمنه الدوري هو :



(14) يتحرك جسم على محيط دائرة نصف قطرها $m (1)$ بسرعة مماسية قدرها $\text{m/s} (2)$ فإن عجلته المركزية بوحدة (m/s^2) تساوي :

- 9 6 4 $\frac{3}{2}$

(15) ربط حجر في خيط طوله $m (0.4)$ وأدير في وضع أفقي فكان زمنه الدوري $s (0.2)$ فإن عجلته المركزية بوحدة (m/s^2) تساوي :

- $40\pi^2$ $20\pi^2$ 40π 20π

معتاد

السؤال الثالث:

(أ) : قارن بين كل مما يلي حسب وجه المقارن المطلوب في الجدول التالي :

الحركة المدارية	الحركة الدائرية المحورية (المغزلية)	وجه المقارنة
.....	التعريف
السرعة الزاوية (الدائرية)	السرعة المماسية	وجه المقارنة
.....	التعريف
العجلة الزاوية	العجلة الخطية	وجه المقارنة
.....	التعريف
.....	العلاقة الرياضية

(ب) : أذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من :

(1) مقدار السرعة المماسية لجسم .

.....

(2) مقدار العجلة المركزية .

.....

(3) العجلة الزاوية.

.....

(ج) : علل لكل مما يلي تعليلاً علمياً سليماً :

(1) تسمى سرعة الجسم الذي يتحرك على طول مسار دائري بالسرعة المماسية.

.....

(2) في أي نظام دائري تكون لجميع الأجزاء السرعة الدائرية (الزاوية) نفسها على الرغم من أن السرعة الخطية أو المماسية تتغير .

.....

(3) العجلة المماسية لجسم يتحرك حركة دائرية تساوي صفر، بينما العجلة المركزية ثابتة المقدار .

.....

(4) العجلة الزاوية في الحركة الدائرية المنتظمة تساوي صفر .

.....

معتاد

(د) : فسر مايلي

1- كلما زادت سرعة دوران لعبة الساقية الدوارة في المدينة الترفيهية زادت السرعة المماسية.

حل المسائل التالية:

(1) ذهب محمد وفهد إلي المدينة الترفيهية وجلسا علي حصانين في لعبة دوارة الخيل التي تدور بسرعة دائرية منتظمة تساوي دورة واحدة كاملة كل (30) ثانية، فإذا علمت أن محمد يبعد عن محور الدوران (1.5)m ، بينما يبعد فهد مسافة (3)m عن محور الدوران . أحسب ما يلي:

1- السرعة الدائرية لكل منهما.

2- السرعة الخطية لفهد .

3- العجلة المركزية لمحمد.

(3) يدور جسم مربوط بخيط على محيط دائرة نصف قطرها (120) cm بسرعة زاوية تساوي (90) دورة في الدقيقة أحسب ما يلي :

1- السرعة الخطية .

2- العجلة المماسية.

3- العجلة المركزية .

4- العجلة الزاوية .

مُعْتَمَد

الوحدة الأولى: الحركة

الفصل الثاني: الحركة الدائرية

الدرس (2-2) القوة الجاذبة المركزية

السؤال الأول:

أ- أكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية:

- 1- القوة التي تسبب الحركة الدائرية ويكون اتجاهها دائماً نحو مركز الدائرة . (.....)
- 2- نسبة قوة الاحتكاك (\bar{f}) على قوة رد الفعل (\bar{N}) . (.....)

ب- أكمل العبارات التالية بما تراه مناسباً:-

- 1- إذا كان اتجاه القوة المؤثرة على الجسم المتحرك عمودية على اتجاه مساره ، فإن هذا المسار يكون
- 2- القوة الجاذبة المركزية لا تغير من مقدار الجسم ولكن تغير من
- 3- من أنواع القوة الجاذبة المركزية و و
- 4- تسمى القوة العمودية على المسار الدائري للجسم المتحرك ب.....
- 5- سيارة كتلتها 1000 Kg ، تتعطف على مسار دائري على طريق أفقية ، فإذا كانت قوة الاحتكاك بين عجلات السيارة والطريق الأفقية تساوي 6000 N . فإن معامل الاحتكاك يساوي
- 6- عندما تكون قوة الاحتكاك بين عجلات السيارة والطريق الأفقية أقل من القوة الجاذبة المركزية السيارة عن مسارها .

السؤال الثاني:


ضع علامة (✓) في المربع الواقع أمام أنسب إجابة لكل من العبارات التالية:-

- 1- حجر مربوط بخيط ويدور حركة دورانية منتظمة في مستوى أفقي فإذا قطع الخيط فإن الحجر:
- يستمر بحركته حول المركز بنفس السرعة يستمر بحركته حول المركز بسرعة أقل
- يتحرك بخط مستقيم باتجاه السرعة الخطية يسقط مباشرة على الأرض
- 2- القوة الجاذبة المركزية لجسم يتحرك حركة دائرية منتظمة بسرعة زاوية ثابتة المقدار تتناسب تناسباً:
- طردياً مع نصف قطر المسار عكسياً مع نصف قطر المسار
- طردياً مع مربع نصف قطر المسار عكسياً مع مربع نصف قطر المسار
- 3- تنتج قوة الجذب المركزية المؤثرة على سيارة تسير على طريق أفقي دائري منحنى عن:
- وزن السيارة وقوة الفرامل القصور الذاتي للسيارة
- قوة الاحتكاك بين إطارات السيارة والطريق جميع ماسبق


معتاد

4- أفضل خط بياني يوضح العلاقة بين متجه القوة الجاذبة المركزية ونصف قطر المسار الدائري عند ثبات

السرعة الخطية :



5- أحد المخططات التالية يمثل العلاقة بين اتجاهات كل من السرعة الخطية والعجلة الجاذبة المركزية والقوة الجاذبة المركزية لجسم يتحرك حركة دائرية منتظمة:



السؤال الثالث:

أ- ما العوامل التي يتوقف عليها كلا من:

القوة الجاذبة المركزية

.....

.....

ب- علل لما يلي تعليلا علميا دقيقا:

1- للعجلة المركزية قيمة في الحركة الدائرية على الرغم من ثبات السرعة .

.....

.....

2- يخرج الماء من الملابس باتجاه الثقوب في النشافة بينما تتجه الملابس نحو داخل الحوض.

.....

.....

ج- ماذا يحدث في الحالات التالية:

1- عند افلات الخيط لجسم مربوط في خيط يتحرك حركة دائرية .

.....

.....

مقطعا

السؤال الرابع:

حل المسائل التالية:

أ- ربطت كرة كتلتها $g(200)$ في طرف خيط طوله $cm(50)$ ثم أديرته بانتظام بحيث تعمل (30) دورة خلال دقيقة أحسب :

1- السرعة الخطية لحركة الكرة

2- العجلة المركزية.

3- القوة الجاذبة المركزية .

ب- سيارة كتلتها $Kg(1000)$ تتحرك على منحنى نصف قطره $m(50)$, بعجلة مركزية مقدارها $2m/s^2$ أحسب :

1- السرعة الخطية للسيارة

2- القوة الجاذبة المركزية

معتاد

الوحدة الأولى: الحركة

الفصل الثالث: مركز الثقل

الدرس (1-3) مركز الثقل

السؤال الأول:


أ- أكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية :

- 1- نقطة تأثير ثقل الجسم . (.....)
- 2- القوة التي يخضع لها الجسم بسبب جذب الأرض له . (.....)
- 3- النقطة الواقعة عند الموضع المتوسط لثقل الجسم الصلب المتجانس . (.....)

ب- ضع بين القوسين علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة علمياً ، وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة علمياً

موقع
almanahj.com/kw

علمياً



1- () عند قذف كرة القاعدة في الهواء كما في الشكل المقابل نجد أنها تتبع مساراً منتظماً علي شكل قطع مكافئ قبل أن تصل إلي الأرض .

2- () تعتبر حركة مضرب كرة القاعدة حركة انتقالية في الهواء .

3- () إذا رُمي جسم في الهواء (كفتحاح انجليزي مثلاً) بدلاً من انزلاقه علي سطح أفقي أملس فإن مركز ثقله يتبع مساراً منتظماً علي شكل نصف قطع مكافئ .

4- () مركز ثقل كرة مجوفة ملئت حتى منتصفها بمعدن الرصاص ينطبق علي مركز ثقلها الهندسي عندما كانت فارغة .

5- () مسار مركز ثقل الألعاب النارية يكون علي شكل مسار قطع مكافئ (بفرض إهمال مقاومة الهواء) .

6- () القوي الداخلية أثناء انفجار الألعاب النارية الصاروخية تغير موضع ثقل القذيفة .

7- () بإهمال مقاومة الهواء نلاحظ أن الشظايا المتناثرة في الهواء من الألعاب النارية الصاروخية تحتفظ بمركز الثقل نفسه كما لو كان الانفجار لم يحدث بعد .

ج- أكمل العبارات التالية بما تراه مناسباً :-

1- تعتبر حركة مضرب كرة القاعدة محصلة حركتين هما حركة وحركة

2- مركز ثقل كرة القاعدة عند قذفها في الهواء يتبع مساراً منتظماً علي شكل

3- الأجسام متماثلة التكوين ومنتظمة الشكل يقع مركز ثقلها عند

4- الأجسام غير منتظمة الشكل يكون مركز الثقل ناحية الطرف

5- يقع مركز ثقل جسم على شكل مثلث على الخط المار بمركز المثلث ورأسه ويكون على بعد من القاعدة يساوي الارتفاع.

معتاد

السؤال الثاني:

ضع علامة (✓) في المربع الواقع أمام أنسب إجابة لكل من العبارات التالية :-

1- عند تطبيق قوة على جسم ما في مركز ثقله بحيث تكون معاكسة في الاتجاه لقوة ثقله ومساوية لها في المقدار فإن الجسم:

- يتحرك حركة دورانية
 يتحرك حركة دورانية وأخرى انتقالية
 يتحرك حركة انتقالية
 يترن

2- مركز ثقل مضرب كرة القاعدة يكون:

- عند مركزه الهندسي
 أقرب إلى الجزء الأخف
 ناحية الطرف الأثقل
 عند منتصف المضرب

3- مركز ثقل مخروط مصمت الشكل يكون على الخط المار بالمركز ورأس المخروط وعلي بعد يساوي:

- $\frac{1}{6}$ الارتفاع من قاعدته
 $\frac{1}{3}$ الارتفاع من قاعدته
 $\frac{1}{4}$ الارتفاع من قاعدته
 $\frac{1}{2}$ الارتفاع من قاعدته

4- مركز ثقل جسم منزلق بحركة دورانية يتبع مساراً على شكل:

- منحنى
 مستقيم
 قطع مكافئ
 نصف قطع مكافئ

السؤال الثالث:

(أ) : قارن بين كل مما يلي حسب وجه المقارن المطلوب في الجدول التالي :

الأجسام غير منتظمة الشكل	الأجسام متماثلة التكوين ومنتظمة الشكل	وجه المقارنة
.....	موضع مركز الثقل
مخروط مصمت	قطعة رخام مثلثة الشكل	وجه المقارنة
.....	بعد ارتفاع مركز الثقل عن القاعدة

(ب) : علل لكل مما يلي تعليلاً علمياً سليماً :

1- يعتبر مركز ثقل الجسم نقطة توازن له.

.....

2- مركز ثقل جسم ينزلق أثناء دورانه حول نفسه على سطح أفقي أملس يتحرك في خط مستقيم و يقطع مسافات متساوية في فترات زمنية متساوية.

.....

معتاد

الوحدة الأولى: الحركة

الفصل الثالث: مركز الثقل

الدرس (2-3) مركز الكتلة

السؤال الأول:

أ- أكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارة التالية :

الموضع المتوسط لكل جميع الجزيئات التي يتكون منها الجسم. (.....)

ب- ضع بين القوسين علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة علمياً ، وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة أ:

1- () مركز الكتلة لجسم كتلته موزعة بشكل متجانس ولا تتغير كثافته من نقطة لأخرى ينطبق علي مركزه الهندسي.

2- () مركز كتلة جسم غير متجانس يكون أقرب إلي المنطقة التي تحتوي علي كتلة أصغر.

3- () ينطبق مركز كتلة المجموعة الشمسية على المركز الهندسي للشمس تقريبا طالما ان الكواكب مبعثرة حول الشمس في جميع الجهات.

4- () إذا اصطفت الكواكب علي أحد جانبي الشمس يصبح مركز كتلة المجموعة خارج سطح الشمس.

5- () لا تدور كواكب المجموعة الشمسية حول مركز الشمس ، بل حول مركز كتلة المجموعة الشمسية .

ج- أكمل العبارات العلمية التالية :

1- مركز كتلة مطرقة من الحديد يكون إلى رأسها الحديدي.

2- يختلف مركز كتلة حلقة دائرية عن قرص دائري في أن يكون مركز كتلة الحلقة يقع الجسم، بينما مركز كتلة القرص يقع الجسم وكلاهما ينطبق مع للجسم.

3- مطرقة تتكون من رأس حديدي وساق خشبية، فإن مركز كتلة المطرقة يكون أقرب إلى

4- يتحرك مركز كتلة القذيفة التي تنفجر في الهواء كالألعاب النارية قبل انفجارها على مسار

السؤال الثاني:

ضع علامة (✓) في المربع الواقع أمام أنسب إجابة لكل من العبارات التالية :-

1- مركز كتلة حلقة دائرية يكون:

في مركز الدائرة وينطبق مع المركز الهندسي في مركز الدائرة ولا ينطبق مع المركز الهندسي

أقرب إلى المنطقة التي تحتوي كتلة أكبر أقرب إلى المنطقة التي تحتوي كتلة أصغر

2- مركز كتلة جسم كتلته غير متجانسة يكون:

في مركز كتلة الجسم وينطبق مع المركز الهندسي أقرب إلى المنطقة التي تحتوي كتلة أكبر

في مركز كتلة الجسم ولا ينطبق مع المركز الهندسي أقرب إلى المنطقة التي تحتوي كتلة أصغر

3- يتحرك مركز كتلة القذيفة التي تنفجر في الهواء مثل الألعاب النارية في مسار على هيئة:

نصف دائرة قطع ناقص نصف قطع مكافئ قطع مكافئ

معتاد

السؤال الثالث:

(أ) : قارن بين كل مما يلي حسب وجه المقارن المطلوب في الجدول التالي :

وجه المقارنة	حلقة دائرية	إطار المستطيل
موضع مركز الكتلة
وجه المقارنة	جسم كتلته موزعة بشكل متجانس	جسم كتلته موزعة بشكل غير متجانس
موضع مركز الكتلة

(ب) : علل لكل مما يلي تعليلاً علمياً سليماً :

1- مركز الثقل لمركز التجارة العالمي والذي يبلغ ارتفاعه m (541) يقع عند (1mm) أسفل مركز كتلته .

.....
.....

2- لا ينطبق مركز الثقل مع مركز الكتلة عندما تكون الأجسام كبيرة جداً.

.....
.....

مُعْتَمَد

الوحدة الأولى: الحركة


الفصل الثالث: مركز الثقل

الدرس (3-3) تحديد موضع مركز الكتلة أو مركز الثقل

السؤال الأول:

أ- ضع بين القوسين علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة علمياً، وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة:

- 1- () يقع مركز ثقل جسم منتظم الشكل مثل المسطرة في منتصفها تماماً أي عند مركزها الهندسي.
- 2- () مركز ثقل جسم منتظم الشكل يمكن أن يكون نقطة خارج الجسم إذا كان الجسم مصمتاً.
- 3- () موقع مركز ثقل الأجسام المجوفة مثل كوب ماء فارغ يكون نقطة موجودة على الكوب نفسه.
- 4- () موقع مركز ثقل الأسطوانة في الشكل المجاور ينطبق مع المركز الهندسي للأسطوانة.



- 5- () كتلتان نقطيتان تقعان على محور السينات كتلتيهما $m_1 = (2)Kg$ و $m_2 = (8)Kg$ تبعدان الواحدة

عن الأخرى مسافة $6cm$ فإن مركز كتلة الجسمين يقع في الموضع $(0, 4.8)$ وأقرب إلى الكتلة m_1 .

- 6- () يمكن أن يكون مركز كتلة جسم منتظم الشكل ومفرغ نقطة مادية من الجسم وخارجه.
- 7- () يكون مركز الكتلة لكتلتين متماثلتين تبعدان الواحدة عن الأخرى مسافة محددة نقطة في الوسط بين الكتلتين.

ب- أكمل العبارات التالية بما تراه مناسباً: -

- 1- مركز الكتلة في الأجسام منتظمة الشكل ينطبق مع المركز الهندسي للجسم، ويمكن أن يكون نقطة مادية من الجسم إذا كان الجسم أو نقطة خارجه إذا كان الجسم
- 2- موقع مركز كتلة عدة كتل موجودة في مستوي واحد يعتمد على

السؤال الثاني ضع علامة (✓) في المربع الواقع أمام أنسب إجابة لكل من العبارات التالية:

- 1- كتلتان نقطيتان $m_1 = (1)Kg$ و $m_2 = (3)Kg$ تبعدان الواحدة عن الأخرى مسافة $8cm$ فإن موضع مركز الكتلة يقع على محور السينات في الموضع:

$(0, 6cm)$ $(0, 4cm)$ $(0, 2cm)$ $(6cm, 6cm)$

- 2- كتلتان نقطيتان $m_1 = 5Kg$ و $m_2 = (1)Kg$ تبعدان الواحدة عن الأخرى مسافة $50cm$ فإن موضع مركز الكتلة يقع:

عند منتصف المسافة بين $(m_1$ و $m_2)$

علي الخط الحامل للكتلتين وجهة m_1 وخارجهما

بين $(m_1$ و $m_2)$ وأقرب إلى m_1 من الداخل

بين $(m_1$ و $m_2)$ وأقرب إلى m_2 من الداخل

معتاد


3-كتلتان نقطيتان كتلتان نقطيتان $(m)Kg$ و $(3m)Kg$ تقعان على محور السينات وتبعدان الواحدة عن الأخرى مسافة $(10)cm$ فإن موضع مركز كتلة الجسمين يكون على بعد:

$(2.5)cm$ من الكتلة $(3m)$

$(5)cm$ من الكتلة $(3m)$

$(7.5)cm$ من الكتلة $(3m)$

$(7.5)cm$ من الكتلة $(3m)$



4-وضع جسمان نقطيان كتلتها (m) و $(4m)$ علي التوالي كما في الشكل المجاور فيكون موضع مركز كتلة هذا النظام بالنسبة إلى النقطة (a) بوحددة (cm) مساوياً :

40

25

12.5

10

السؤال الثالث:

(أ) : قارن بين كل مما يلي حسب وجه المقارن المطلوب في الجدول التالي :

		وجه المقارنة
وعاء	كرسي	
		أين موقع مركز الثقل

(ب) : علل لكل مما يلي تعليلاً علمياً سليماً:

1- يمكن وجود أكثر من مركز ثقل لجسم واحد.

2- يمكن موازنة المسطرة بالتأثير على مركز الثقل بقوة واحدة لأعلى.

3- الشكل المقابل يمثل كتلتين نقطيتين تقعان على محور السينات فإذا




حلت كل منهما محل الأخرى فإن مركز الكتلة للمجموعة يتغير

موضعه.

معتاد


السؤال الرابع:

حل المسائل التالية: -



(أ) ثلاث كتل نقطية وضعت على خط مستقيم كما في الشكل المقابل، والمطلوب
أحسب موقع مركز الكتلة للنظام.

موقع
المناهج الكويتية
almanahj.com/kw



(ب) الشكل يوضح ثلاث كتل نقطية وضعت على رؤوس
مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه $(20) cm$ ،
فإذا كانت نقطه (A) هي نقطة تقاطع محاور الإسناد
(x, y) أحسب موضع مركز الكتلة للمجموعة.