

تم تحميل هذا الملف من موقع ملفات الكويت التعليمية



[com.kwedufiles.www//:https](https://www.kwedufiles.com)

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر العلمي اضغط هنا

<https://kwedufiles.com/13>

* للحصول على جميع أوراق الصف الحادي عشر العلمي في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا

<https://kwedufiles.com/13math>

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر العلمي في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل الأول اضغط هنا

<https://www.kwedufiles.com/13math1>

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الحادي عشر العلمي اضغط هنا

<https://www.kwedufiles.com/grade13>

* لتحميل جميع ملفات المدرس أحمد عبد الفتاح كناس اضغط هنا

[bot_kwlinks/me.t//:https](https://t.me/bot_kwlinks)

للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا

الروابط التالية هي روابط الصف الحادي عشر العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي

مجموعة الفيسبوك

صفحة الفيسبوك

مجموعة التلغرام

بوت التلغرام

قناة التلغرام

رياضيات على التلغرام



وزارة التربية

الإدارة العامة لمنطقة الفروانية التعليمية

مدرسة مرشد سعد البذال ث . بنين

قسم الرياضيات

نماذج

اختبارات تدريبية

الفترة الدراسية الأولى

الصف الحادي عشر علمي

من إعداد معلم الرياضيات

الأستاذ : أحمد عبد الفتاح كناس

نموذج رقم (٣)



العام الدراسي : ٢٠١٩ - ٢٠٢٠



وزارة التربية
الإدارة العامة لمنطقة الفروانية التعليمية
مدرسة مرشد سعد البذال ثانوي بنين

نموذج اختبار تجريبي (٣)
للفيف الحادي عشر علمي
الفترة الدراسية الأولى
عدد الصفحات : ١٢ صفحات

العام الدراسي : ٢٠١٩ - ٢٠٢٠
المجال الدراسي : الرياضيات
الزمن : ساعتان وخمس وأربعين

أولاً : الأسئلة المقالية : اجب عن الأسئلة التالية موضحاً خطوات الحل في كل منها

السؤال الأول :

(a) أوجد مجموعة حل المعادلة : $\sqrt{5x - 1} + 3 = x$



تابع السؤال الأول :

$$-x^2 - 3x \geq 10$$

(b) أوجد مجموعة حل المتباينة :




السؤال الثاني :

$$y = \log_3 (x - 2) + 3$$

(a) ارسم بيان الدالة :

مستخدماً دالة المرجع والإزاحة.



تابع السؤال الثاني:

(b) أوجد مجموعة حل المعادلة التالية مستخدماً خواص اللوغاريتمات :

$$\text{Log}_4(x + 6) - \text{Log}_4(12) = \text{Log}_4(2) - \text{Log}_4(x - 4) \quad , x \in (4, \infty)$$



ينبع : نموذج اختبار الرياضيات الفترة الدراسية الأولى للصف الحادي عشر علمي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

السؤال الثالث :

(a) باستخدام الأعداد النسبية الممكنة.
أوجد مجموعة حل المعادلة $x^4 - 3x^3 - 7x^2 + 27x = 18$



تابع السؤال الثالث:

(b) (1) إذا كان $\vec{A} \cong 3i + 4j$ $\vec{B} = \langle -2, 5 \rangle$ أوجد $2\vec{A} + \vec{B}$ (I)

(II) قياس الزاوية المحددة بالمتجهين \vec{A}, \vec{B} لأقرب درجة .

(2) إذا كانت $\vec{U} = \langle x, 3 \rangle$, $\vec{V} = \langle -4, 2 \rangle$

أوجد قيمة x التي تجعل $\vec{U} // \vec{V}$.



السؤال الرابع:

(a) أوجد مجموعة حل كل من المعادلتين التاليتين :

1) $2(x + 3)^{\frac{3}{2}} = 54$



2) $5^{(2x-6)} = 1$

تابع السؤال الرابع:

(b) لاحظت شركة تجارية ان المتوسط الحسابي لارباحها 325 دينار بإنحراف معياري 105 دينار .

- (I) طبق القاعدة التجريبية .
(II) هل وصلت أرباح الشركة إلي 600 دينار؟ فسر ذلك.



القسم الثاني: البنود الموضوعية :

أولاً : في البنود (1-4) ظلل في ورقة الإجابة (a) إذا كانت العبارة صحيحة و (b) إذا كانت العبارة خاطئة

(a) (b) $|m| \times \sqrt{m^2} = m^2, \forall m \in R$ (1)

(a) (b) مجموعة حل المتباينة $(x + 3)^2 > 0$ هي R (2)

(a) (b) مجال الدالة $f(x) = \frac{\sqrt{x^2}}{x}$ هو $(-\infty, 0)$ (3)

(4) القيمة المعيارية للمفردة 14 مقارنة بقيم بيانات حيث المتوسط الحسابي 12.5

(a) (b) والانحراف المعياري 6 هي 0.25.

ثانياً : في البنود (5-14) لكل بند أربع إختيارات واحد منها فقط صحيح اختر الإجابة الصحيحة ثم ظلل دائرة الرمز

الدال على الإجابة الصحيحة :

(5) مجموعة حل $\sqrt[3]{x-1} = \sqrt{x-1}$ هي

(a) {2}

(b) {2, 3}

(c) {1, 2}

(d) {1, 2, 3}

(6) معادلة محور التماثل للقطع المكافئ $y = x^2 - 6x + 2$ هي

(a) $x = 12$

(b) $x = 6$

(c) $x = 3$

(d) $x = 2$

(7) إذا كان $x^2 - xy + y^2 = 4, x + y = 2$ فإن $\sqrt[6]{x^3 + y^3} =$

(a) $\sqrt{2}$

(b) $\sqrt[3]{2}$

(c) $\sqrt[3]{6}$

(d) 2

(8) 5 يمكن ان تكون صفراً من أصفار الحدودية

(a) $f(x) = ax^3 + x^4 + 5$

(b) $f(x) = x^5 - 1$

(c) $f(x) = 5x^3 - 6x - 1$

(d) $f(x) = (x + 5)(x^2 + 25)$

(9) إذا كان صفر هو باقي قسمة $f(x) = 2x^3 - 4x^2 + kx - 1$ على $(x + 1)$ فإن k

تساوي

(a) 7

(b) -7

(c) -3

(d) 3

(10) معكوس الدالة $y = x^2 + 2$ هو

(a) $y = \sqrt{x-2}$

(b) $y = -\sqrt{x-2}$

(c) $y = \pm \sqrt{x-2}$

(d) ليس أي مما سبق

(11) إذا كان $\log 2 = 0.301$, $\log 3 = 0.477$ فإن $\log \frac{8}{3}$

(a) 0.477

(b) 0.426

(c) 0.601

(d) 1.301

(12) يمكن رسم بيان الدالة $y = \frac{1}{2}(5)^{x+2} - 3$ باستخدام بيان الدالة $y = \frac{1}{2}(5)^x$

(a) وحدتين جهة اليسار و ثلاث وحدات لاسفل

(b) وحدتين جهة اليمين و ثلاث وحدات لاسفل

(c) ثلاث وحدات جهة اليمين و وحدتين لأعلى

(d) وحدتين جهة اليمين و ثلاث وحدات لأعلى

(13) إذا كان $(1.5)^x = 356$ فإن :

(a) $x \approx 15$

(b) $x \approx 14.5$

(c) $x \approx 15.3$

(d) $x \approx 16.3$

(14) إذا كان $\vec{u} \perp \vec{v}$ ، $\vec{u} = \langle -5, m \rangle$ ، $\vec{v} = \langle 2, 3 \rangle$ فإن m تساوي:

(a) $\frac{10}{3}$

(b) $-\frac{3}{10}$

(c) $-\frac{10}{3}$

(d) $\frac{15}{2}$

انتهت الأسئلة